

Ex Bibliotheca majori Coll. Rom. Societ. Jesu





PETRVS A' CASTRO DE FEBRE MALIGNA:,





PETRI A CASTRO BAYONATIS

FEBRIS

PVNCTICVLARIS

Aphorismis delineata.

DICATA

Illustrissimo, atque Generosi so.

FRANCISCO XAVERIO

Nob.Fluminensi Liburno?

INCL. NAT. GERMANICÆ ART CONSILIARIO

Nec non in celeberrimo Patavino Archi gymnasio Alma DD. Theologorum Philosophorum , ac Medicorum Vniversitatis Pro-Syndico

49 64 49 64

PATAVII, MDCLXXXVI

Typis Iacobi de Cadorinis, Super. Permissu.



ILLVSTRISSIME, AC Generofils.D.



Aligna (æuiebat olimis, per Orbem Febris, cum eo tempore, sapientissimus Petrus a Castroverès salutis Petra, ac Medi-

cinæ Castrum peritissimis in operes experimentis ipsam expellere curauerit, ipsaus pariter curandæ methodum in seriptiss relaxare præseripit. Tanti opus prætijut in lucem ederent insudarunt præsa, utsper eiusdem documenta malignams febrem dissipare perciperent mortales f.

Mea & prela felici forte bearunt:
aftra ut in lucem iterum tamprætiolum demandarent opusculum; a
quo, veluti Apollinis ab Oraculo
Medicinæ arcana studiosa perciperet inuentus. Ast ut maiori decoratam sorte incederet illud conspicud
alicuius Heroi nomine, ut omen
reciperet insignire decreui; nec illustrius reperire nomen, sum arbitra-

& tor.

tor quam tuum Huftriffime, ac generoisime Vir, nempe cum litterarum in Cœlo, Medicinæ in sphera fydus eluceas hoc tibi facrandum. erat opus, ut & a tui nominis omis ne malignam in nihilum redigiere febrenrediscerent studiosi.Ingentes generofitui animi dotes effent iure recenten æ, nifi, cum germanica fis ortus ab' Aquila te magnum patefacere sufficeret, imbelles enim fortes non progenerant Aquilæ Columbas; & cum Inclita in Natione Germanica Confiliarius, ac in Artistarum Vniversitate Prorefor existas, te magnum dignosci fit fatis. Tuo igitur in gremio hoc Opus refoue, & fi ab iplo malignam febrem expelli percipitur, ab eo-dem fors mihi benigna elargiatur, ut, mese ad incrementum gloria, adferiptus ab orbe cog nolcar

Dom.tuæ Ill.ac Gener.

Patavij die 15. Augusti 1685. Humilliss.adfrictifs. & obsequentifse-

semper client
Lacobus Cadorinus.

AVTORIS PRÆFATIO

Studiosissimis Meritissimisq; viris Philosophia, as Medicina DD.

FRANCISCO IONÆ Patric. Veron.
GOTOFREDO TILESIO,
MAXIMILIANO VVALTHERO,
MARFINO VVIRTH,
GEORGIO CHOISTIANO STO

GEORGIO CHRISTIANO STO-

CHRISTIANO DOMNISCH, BALTHASARI VVALCLKMER, I. MARTINO PABRO, SEBASTIANO NETH, Germanis

Dilettifimis in praxe discipulis

PETRVS A CASTRO Medicus Veronensis.



Orbismmaniter hac tempest ate grassantis, Luves nes Clarissimi, non semel descriptione postulastis: ecce vobis accuratam, O

quanta potni brevisate compilatam exhibeo. Accuratam, quandoquidem tei dignitas non pasitur extremis labristanti momente disciplinam degustari. Brevem, ut exastius liceat adi pisci, mentisq, adytis altius recondi

AVCTORIS:

doetrinam un qua morborum fere ons nium compēdium invenieris. Ab una namq; ista febre,tanquam de crudeli Pandora pyxide, pullulare vidistis fa pius Morberii, ac Symptomatii omne genus Percurrite cerebri morbes,ec+ ce in febri Puntticulari phrenitides 200 lethargos, typhlomanias, deliria, obii. viones, insignes tristitias, cephalaas; vigilias, somnolentias, epilepticos in: sultus, convulsiones, dentiu stridores, tremores, horrores, jactationes, furditates, aurium tinnitus, narium hamor rbagias, vertigines, cacitates, strabismos, mutitates, & mille alia-Dinertite mox paulo inferius; ecce ex alioagmine insurgent, angina suffocantes, suffes irrequiera feridi anbelicus diff eiles respirationes, pulsuum mille varietates, & araxia, cordis denig; graviores affectiones, soncope nempe, lipc -s bymia, palpitationes, febrin omne ge nus varys insignium differentis. Alianama; se exhibet horrifica; sudo. rifica aliz, uliz ampallofa; Jeu pemphingodes, alie lassitudinaria, alia: anxiosa, urentes, lippria, pallida, livi-

PRÆFATIO.

da,ut hieusurpem Hippoc elegantem febrium partitionem 6. Epid feet. I. rex.21. vobis exhibentis Principi viscari propeer sympathiam adharebut acres cardialgia, mox ex imo ventre subsilient singultus, inanes nausea, vomitus irriti, inappetentia fastidio. fissima, sit is inexhausta, O quandoque cum mira lingue ariditate nulla, lin. guarŭ nigredo, ac horrida scabrities. Pertinacifima praterea viscerum ob Aructiones, quin & ipforn parenchymatum corruptiones immedicabiles isteri ancipites, intestinoru murmura cruciatus, cholera, diarrhoxa, dyfenteria, tenesmi, verminationes, urinarte sum laxa profluvia, tum areta suppressiones, o quod tandem sine admiratione ingenti no potnifis observares impudica satyriases rara crisi forsan: indicanda, de qua Hipp 6 Epid felt.2 1ex. 31. Sed quid in corporisperiphes ria, quid in universali corpore non in dicabit hydra multiceps ifta? Longums esset maculas, pustulas, tumores, paros tides, gangranas, antbraces, sudores feridos, exfolveres madores, coliquas

VVCTORIS

tes affluxus, dolorci ambulatiuos, quist of phthiriales recensere. Sed has videntur sufficere, ut universalem ferme praxin in uno morbo, o tota medicina in uno coacerusta affettu concipiatis, of stores vestraru annua praxi observationum accurati colligatis, serta aliquando paraturi, o o civicis corolais gloriosa redimituri tempora,

Affettus tamen iste, quod videatur in dies ferocius debachari, & grassari acerbius, tanta de zteritate transtandus venit, ut in singulis singulari ute. dum sit methodo, ac diversapenstus medendiratione. Quibusdam enim d principio conveniunt lenientia, quibusdam nocent, alios cerebri sudores liberant, alios & plurimos perimunt. Sanguinis evacuatio cunctis semper profuit, sed diversimode, o aprotempore decentique copia celebrata, non diminuta errore Erafistratico . Metu enim inani infamantur nobilia artis prasidia, O vulgus indelebili, ac pertinaci imbuitur abufu. Modus tamen in rebus est, nec semper effrenands bamores maligni, ablato sanguinis dulci

PRÆFATIO

dulci contubernio : nibil perniciosius. si absque delectu, ac prameditatione usur petur; vesicantia non valde hoc tëpore prodesse visasunt : forsan quia crises salubriter futuras divertere possent. Alvi fluxu major parsevasit, purgantia tamen medicamenta, aut semipurgantiaante decimam quarta exhibita multos in ruinam egerunt, conturbatis magis, ac magis exacerbatis humoribus. Hac omnia, ac multo plura, non solum in nostris curationibus diligenter annotastis; sed in dinersis pariter consultationibus, quas cum Claris Veronensibus Archiaeris sapius inivimus. Asulta quidem ex abundati penu Dottiffimi Alexandri Lilca, nobilitate, atate, & confilio excellentis, inquem unum priscorum Verenensium Medicorum, tot seculis ac terrisillustrium, antiqui jubaris cuntti simul videtur radij collimasse. Non minora ex Aurato Equite Francisco Pona, Musarum Corculo, Artis peritia omnigena eruditione, sermonisq; venustate inimitabili Selestissima quam plura ex Lyceo acu. ti[imi

AVCT. PRÆF.

wisimi Hieronymi Franzosij (Zyceum enim valde suum sibi fecit alser Arifot.) qui ingeni segacitate, fententiarum foliditate, fevera deni. que gravitate, dignitatis medica unieus affertor vere dicipotest . Accuratam denig; medendi Methodum a meritissimo Octanio Franchino, prudentia, desteritate moruma; suavitate insigni. Quibus non pænitebit ex junioribus adnectere Alder cum, ac Sedarbonum, quos inter cateros Collegy Veronensis perinssimos viros sa. pius audistis odorem Hippocraticum (pirantes . Ex his abunde potuiftis coprofum vobis parare commensum, re-Aeque pramuniri, ut fi aliquando ira. to Numine contigerat à tali ferocissamò heste obsideri vestras civitates, impeta adorientis valide propulsare, ac fortiter sustinere valeatis. Valete interim, & munusculum iftud grate animo, & tenaci memoria accipite.

Veronz



MALIGNA FEBRIS

PVNCTICVLARIS

Aphorismis delineata.

SECTIO I.

Natura; ortus , & nomen febris pulicaris & ut antiquis cognita : à pestilentibus, er putridis diversa.

· 1.



Nconftantem, & incertam. huius febris naturam.ex multorum accidentium fyndrome, facile eft, eriam mediocriter peritis, adipifci; at ex vno, vel altero figno , &

fæpe fub specie boni larvato, non ita facilè: Nam valde peritis quandoque medicis fimilitudines pariunt errores & difficultates. 6. Epid.f. 8, text. 44.

Sæpe fuccedit ifta febris, ideam referens intermittentium , & tamen breui , quinta

DE FEBR. MALIG.

scilicet, septima, aut nona, incipit oftenderesuam seritatem. Hoc est quod dictur ;
febrem mutasse naturam, & sactam suise,
maliguam : Erat quidem à principio talis,
sed occultabantur seminaria . Sic intelligo
Hippocratem 7. Epid. tex. 80. ubi errores in
victus ratione describens , & edulia pravi
succi, ex quibus producitur morbosus apparatus, ait : Et sebres intermittentes, & quibus rigores accidunt , ha aliquando maligua sum .

III.

Hinc definitio optima huius febris, que dicit, febrem quidem continuam este, sed nulli continuarum adfrictam, cum sepento fub specie continuarum subintrantium invadat, & rédoleat naturam; intermittentium, ut melius fallat. Que enim Terrians modum sebres reservant, & anxia sunt; maligna: a alebant Hipporrates 1.1. Coac, text. 34.

I.V.

In hoc consistere morbi malignitatem .

& versipellem huius sebris naturam infinuat eleganter Bassianus Landus in Iatrologia: si quidem per initia medicolsacilis
se malignus morbus præbet, sed progressus
temporis virus alit, & clandessinis insidis
appagnat, & nullum de se prius judicium
fieri permittit, quam exitium paraverit,
& oppresserit, usque adeo incerta eussindicia sunt, ut dum egro anima est, maguam
guam

gnam plerumque spem medico saciat; quandoquidem ets coctionem ostendat humor, tamen sebrem sovet, & prater evidentem rationem producit, adeo ut natura eits, & estectus nequeant ad manifestas causas redigi.

у.

Germinavithæc febrisiam iam demortua, & nomine etiam ferè obliterato, circa amunu 1575 maximam Europe partem depopulando: tefrixifie postmodum, ac mitigari visa est, ad annum vsque 1570, post quem rursus transacto bello Granatens, acerbissimas resumpsit vires, & adhominum perniciem atrocius repullulayit,

VI.

Necantiquis certe fuit ignota, cum huiss meminerit Hippocrates lib. 2. popul, fed. 3, text. 2. in hunc modum: Fiebuns autom in febribus assivis circa 7.8. 6.9. diem asperitudines in cute miliacea, culicum morfibus maxime similes, nonvalde pruriginose.

Actius pariter Tetrab.2. sect. 1.cap. 129. puncticularem sebrem cognovisse videtur, cum in principio inquit: Febrium nom quidem sempliciorum, sed à pravis humoribus ortarum, circa totum corpus exoriunur vibices similes culicum morsibus. Quod quidem evidentius. d. Actuario expecsivant dixerim, sum aitlib, 1.cap. 23.

A 2 multa

Multa variaque exanthematum, o papue larum genera in cute efflorescunt : siquidem alys veluti si à culteibus effent demorfi, aut ab urticis vulnerati, macula cerca cutem exoriuntur , nonnullis rubra aut purperes , nonnullis nigra-emergunt . quales quotidie ex pulicum cimicumque morfibus apparent: caterum ex rubentibus deteriores funt purpureasomnium pefma nigra . Neque harum macularum notitia caruifie Celfum , videntur afferere hec verba: Cum modo circa totum corpus,modo secundum fingulas eius particulas pustula quadam nascuntur, similes his , qua ex urtica verberante efficientur, que à Gracis exanthemata vocantur. lib. 5.c.28.

VII.

Vt varia huius sebris est natura sic plura, & diversa sortiur nomina. Denominatur sigmatica, puncticularis, pultaris, lentieularis, purpurata, unde Galli vocant la pourpre, Hispani Tabardiglio, & pulgon e Itali pesecchie, que Germani Fleckseber, omnia ad macularum rationem, que à dimersorum insessorum morsibus oriuntur, spectant.

Inter pulicarem tamen, & cuticularem, ingentem aliqui notant differentiam: ego non adeo intignem, Pulicaris nullam profus elevationem in cute producit; culcularis aliquam, qualem Italorum vulgus vocat rabbe, aut etiam vesiculæ quadam,

cu

Leu hydatides , que non carent sua malignitate . Accipite diffinctionem ex signis essential bus sebris acutes ; hec questionem nominis potius redolent...

VIII.

Quod hac febris de genere sit pestilentium, colligitur ex Galeno lib. de cibis boni & mali succi, & t. de dissistance, cap. 3, non est tamen pestilens absolute; squia ab aere solum non trahit originem; sed ab humoribus pracipuè ad putredinem paratis; antea tamen postulatina qualem; intemperatam, aut morbidam illam aeris conditionem; qua populatium, & periculosorum morborum causa exissit.

IX.

Differt à vera pestilenti, quia à pestilenti corrumpitur calor, vt à veneno, in hac verò alteratur, qua ratione plu es ex ea evadunt, licet quid amplius quàm alterationem simplicem requirat.

X.

Præterea differunt, quia pestilens conètagium primum obsidet cordis substantiam, deinde contenta, & inde in pestilenti sebre anhelitus graviter olet: Maligna verò non nisi humores vasorum, maiorum tamen, & corum, quæ viciniora cordissunt, propriora tamen quam in allis come

munibus putridis, & fordidiori putredinis genere, quam putredinem oftendit fanguis per veux sectionem extractus, primo quidem bonus maioris discriminis signum, ut dicetur) secundò & tertiò malus & putridus.

XI.

Differunt præteres, quia cum verè pestilens simpliciter, & celeriter sit contagio sa, fomitenr tamen ad tempus relinquit, & ad distans suum venenum transmittit: Matigna verò non sic, sed tantum per contrectationem, & familiarem contactum, & illis tantum, qui illi dispositum apparatum prebent.

XII.

Dissident denique, quod verè pestilentes placida, & mites semper sunt à principio: Maligna verò non semper, sed quandoque cum sevissimis ingruunt symptomatibus aliquando tamen placida, more pestilentium, ita ut medicis plerunque illudant, spectantibus paulò post morbi solutionem.

XIII

Item pestilentes omnia corpora eodem modo apprehendunt; & eddeni habent fymptomata: Maligna sebris variegata..., nec vlium habet pathognomonicum & certum signum, propter tam varium & divertum morbi apparatum.

7

Differt à putridis communibus , modo putredinis fordidicii, & corruptiori, fævioribus fymptomatibus, & fignorum malitia, ita ut non dometur ce dione corruptior a prava putredine orta: quo fit, vt codionibus quodammodo apparentibus; non pauci tempore crifis succembant.

Cor & piritus sevius afficiuntur: quod oftendit virium imbecillitas, & prostatio, quod aliis non ita accidere solet a princ.

XV.

În aliis putridis aliquis quatuor humorū præcipue putret : hac verò , etti præcipuam analogiam ad fanguinem fortistur, omnes putrent in minera, & foco putredinis fordida quadam,& excellenti putredine, que in fanguine extracto, iam coagulato, per medium dinifo no ob foure apparebit: quin & hoc admirabile observatur, quod nuper ars microfcopica detexit, vermibus fcatere minutislimis fanguinem maligne febricitantium: quod afferente Eruditifs.Kirchero aliquoties experti fimms; quod nec Plinium omniscium latuit, dicentem lib. 26.c. 13. Nascuntur in fanguine hominis animantia exesura corpus ; vt ia lacte nutricu tali febre correptarum . In quem fenfum Gal.lib.de præfag. & pulf.cap. 4. & lib. 3.popul. parte 3. comm.27. qualdam effe febres peftilentes fine pefte dicit, idell, fine manifella aeris contagione .

.

DE FEB. MALIG. FEBRIS PVLICARIS

CAVSÆ

SECTIO II.

Quo tempore magis seviat, & quos savius adoreatur.

I.

A Er duobus modis vitiatur, iuxta qualitates, & secundum totam eius subfantiam.

Primum vitium morbos efficit popula-

res, & communes .

Secundum morbos pestilentes, qui tamen utramque requirunt alterationem, & manisestam, & que in tota substantia sit, medicis occultam appellatam: illam ut corpora reddit paratissima ad quodcunque malignum, & pestilens contagium; hanc, ut illud persciat, & excellentem, fordidam, contagiosam putredinem pestilentum sobolem inducat.

11.

Febris hac pulicaris ortum habuit ab aere aliquid amplius obtinente præter primarum qualitatum alterationem; quod etiam occultum appellamus; redolens naturam fubflantiæ aeris leviter mutatæ. Ex qua qua fane mutatione malignas has & peftilentibus finitimus febres fieri compertumeft, it ab annis, quibus graffari copit, inposterum, licet mitius cum aere paulo magis, aut paulo minus affecto perseveraverit, ca corpora ad illam magis dispositacorripiens.

III.

Nec folim à pravis aftroum affrectious, aut maligno siderum influm viciatur aer; sed evidentins uliginosa paludes, cloace; sentine, publica sames, ob praua alimenta-cadauera non humata, loculta equis inicacte, olera putresacta, vapor cannabis ecriorum, quando pigrioribus aquis macerantur, vapor exitialis in specubus; & vifecribus terra latitais, dum erumpit, tandem frequens adhæsus & familiare com mercium com his, qui sebre hae simt correpti, valde frequenter aerem inquinant ac insciunt.

I.V.

Alla huius mali causa est morbosa corporum dispositio, & prauus humorum apparatus ex pravo vite, & victus institutoprogenitus: Hac multiformia & diversanata est inducere symptomata, propter divecsam & multiformem apparatus morbosa
speciem. Quandoque enim seminarium
illud, quod cuti primim, & venulis exiguis adharescens, ad viscera vique per majores dilatatur, & penetrat, invenir dili-

politionem in fanguine; quandeque in bile, nunc in pituita; in melancholia fæpëpropagatur, së pro fucci infecti natura; jam fynochus, jam[cauf n; jam tertiana; jam vero së pituitam si melancholiam referentes febres accenduntur: Inficit së aliquando etiam ichores; quin së in arteriis fipirituyfum fanguinem; vnde febres femper allidus; qua tamen licet variæ fint; unus nibilominus morbus est; unitatemque ex unitate feminariorium habet; que vna funt.

v.

In quibus crassiores succi malignè inficiuntur, hoc vnum valde commune eft, & observatione dignum, quod scilicet ut plu-rimum moneatur morbus per pares, maiori certe periculo, & agrotantium certamine: ut in Philifco, & mille aliis apud Hippoc. videre eft, lib. 1. Epid. fect. 3. ægrot, 1. Figuia morbi tune procedit in hune modum ; Accessio, que primo die incipit ; si non_s terminetur codem ipfo die, femper crefeit ufque ad finem fecundæ diei, itaut in fecundam diem acerbifima totius periodi pars incidat , per pares progredietur morbus : Eodem enim modo fient fequentes periodi, ut ex primo & fecundo,ita ex fertio & quarto, & quinto, & fexto . Quo fit , ut tantò deterius fit moveri acutum morbum per pares , quanto deterius est , quameumque exacerbationem este longiorem : Caufa enim arguitur contumaciffima, & ex multa materia dependens, unde vix tales morbi pollunt elle breves inti fimul fine valde maligni ; auf ratum aliquidcirca evacuationes contingat; quale Abdesitano Pericli; lib. 3. Epid fect. 3. ægrot. 6.

VI.

Preferca cum impares fint magis decretorii, in decretoriis autem diebus facultat.s naturales multim inventur ab aftris;
it.ut qui habent accefliones per pares, minus aditti, deterius ferant. Vt autem
chebus paribus deserius habere malum eft,
ita quarto die gravifimum fquia hic idem
eft par, & decretorius. Gravifimum autem este diebus decreviiis habere deterius, docuit supe Hipp.express reio collipitur ex descriptione tempestatis secunde in Thaslo.lib.t.Epid.eest.z. text. 4.69
ingravescente diebus decretoris.

ŶĬĹ

Furit in omnes caccetes ifte morbus ; frequentius latrante Syrio. Sed hyeme atroctus; juvenes robustiores prefertim invadens, parcens nemini; si cum causone fromi tem adoriatur; Gal. 11. Meth.cap.ominabatur dicens: Dyandoguidam inilia ant pauca falutis babanla spes videtur; quibus in febre usoria ignas intus, ut uri viileantur; accenditur er frigidam praeterea sueria ambiens. Et lib. de libris A 6 prop.

DE FEB. MALIG.

prop. de peste, qua Romam invasit disterens, inquiti Non tam homines ob eius verhementiam mori, quam quod mediahyeme sautres.

VIII.

Hinc est procatarcticis causis frequentissima universe cutis constipatio, que putredinesalit, & auget: Veronæ nulla. frequentior, propter aeris infignem fubtilitatem fimul, & frigiditatem, qui fi pravo miafinate, & tampeftatum præcedentium inæquali discrasia inquinetur , leviter difposita corpore facile fædat ac inficit . Neque à principio externo , ab aere nimirum minimatibus foedato, femper oriri lethifera ifta feminaria existimetis : Solentnamque sporadice apparere ista febres, inoptima etiam aeris constitutione, absque ulla occasione externi contagii, & si mediante quodammedo aere transitus fiat de uno in alios , per contactum feilicet , &: commercium familiare, ut diximus . A principio interno nihil vetat , quin ex morboli apparatus dispositione talis putredinis gradus excitetur, qui malignas istas maculas præ se ferat, & febrem omnibus numeris petechialem, non fecus ac rabiofi canis, & tarantulæ, & aliorum venenorum fymptomata. Abfque cane & tarantula, à fola humorum putredine nata observavimus, illum gradum veneni Napelleum . Animalis Vegetabilis, aut Mineralis, ad voguem attingente putredine .. DuDuplex igitur morbosus apparatus huins sebris causa existit, alter corporis, alter sumorumi qualis à Galeno lib. 1. de distinction se de la composition de la constitution de la constit

SIGNA FEBRIS

SECTIO III.

Describuntur signa , secundum humoris ideam substantialiter inharentia; mox apparentia, ex actionibus lass desumpta.

M Vlta propemodum figna funt hudius febris, at nullum expresse pathegnomonicum, sed multotum syndrome

14-

requiritur, licet adeò fallax sit huius morbi natura, ut ceteris signis circa onnessiacultates nihil mali ottendentibus, unum vel minimum quandoque, quod sepè contem situr, malitiam indicat. Quapropter nihil contemnere inbebat Hipport. In his assure situriture distribution malignicatis cognitioni; ob quam appositissime Galenus morborum incipientium saturam herbis nuper pullulantibus assimilavita quas sion nissi plurimum expertus, & herbasum pericissimus agricola cogniscere possiti, lib. 2. Crisum cap. 2. & lib. 3. Prorth.text. tito. 1.

H.

Vt hac febris per onnes humores divagari folet; figna pariter exert vnicuique humori propria: & quia finul in maffa fanguinea-omines computrefeere folent; hunci fignorum confusio & circonflantia - Sanguinea-pulicaris figna funt utplurimum; lastitudo; gravitas; dotsi dolor; faciei; &C, oculorum rubor; lachrymæ, capitis dolor gravansspulsus magni, pectoris dolor; lumborum dolor; delitium; vigilia; urina rubres macula rubræ.

III.

Vbi verò biliofiòr fuerit fingnis, vel inficitur à feminariis, in his inta quidom eveniont; ardor externus , fitis inexhaufta..., laffitudo vicerofa, anxietas, inquietudo,

l'oquacitas, lingua afperitas, nigredo, & alia.

IV.

Pariter vero infecta cum fanguine pituita, fomnolentos, & graves reddit agratantes, & quadantenus morofos, lentores circa dentes funt, non fitiunt, necinquieti plurimum videntur.

Vito denique, ac amplius affato fanguine, melancholica funt deliria, fomni conturbati ; timores , triflitiæ , taciturnitas, ad parietem conversio macula in purpureum vergentes, livida, nigra.

VI.

Sed generalia nimis funt ista; notate alium lignorum ordinem , & cum præcedentibus quafi alphabethica combinatione confungite. Vt enim ex simplicium elementorum varia adaptatione, infinite propemodum oriuntur fyllabarum differentiæ; fic ex diuerfo fignorum concurfu, diversa, & ferè inexplicabilis morbosi appatatus differentia expiscanda.

VII.

Facultates læfæ vobis figna dabunt: Animalis deliria, vigilias, comata, difficiles anheanhelitos, furditates, rigores, horrores', tremores, convultones, dentium firidores, animi deliquia, inappetentias, dolores in aliqua corporis parte fixos, brevi quandoq; evanescentes, iactationes, inquietudires.

VIII.

Vitalis, pulsus varios, crebros, parvos, minimos, intercidentes, palpitationes, syncopes.

IX.

Naturalis ; narium irritam hæmorrhae giam ; stillam sanguinis ; vomitum bilis pallidæ, slavæ, vitellinæ, porracæe, rubræ, ærugineæ : diarrhœam, choleram ; dysenteriam, sudores, maculas ; vesiculas ; tanquam ab igne ; & alis.

XL.

Sed horum quædam breviter examinétur, & desumantur primum ab his, quæfubstantialiter inherent, sitque caloris sebrilis ratio & modus; Nam sapibs initio mitis apparet, (Parva febres quandoque valde maligna : dicebat Hippoet, 1 qui tamen pravis concomitatur accidentibus, dolore (yncipitis acuto, nausea, vomitu, vigilia, inquietudine, & aliis, sque non conveniunt parva sebri; Ex ista inaqualitate: sufficemini latentem frandom.

Causa

XI.

Causa propter quas calor sentitur ad tactum mitis, & sebiis parva, & sepulta, ut loquitur Avicenna, iste sunt: Retroceffus spirituum ad viscera, qua majus in hac sebre dispendium patiuntur; humorum crassities, ob adustionem, aut crassa pituita missuram. Denique quia in hac sebre sepe venenum & malitia magis vigent, quam putredo, quia simaior sit putredo quam venenum, statim à principio vehemens apparet sebris.

XIL

Secundum in hoc genere fignum eft Rigor, à quo ut plurimum incipiunt hæ febrmalignæ pulicares, non quod fint de genere intermittentium, (quod aliqui perperam cogitant] sed verè continue maligna, quibus fimiliter contingit incipere à rigore, & fecundo, aut tertio die fequentibus mentiri periodicas duplicium tertianarum subintrantium refrigerationes : ut contigit Pythioni in Tha. lib. 3. Epid. fect. 3. ægr. 3. Tum quia maligna qualitas rigores intempeliuos, ut alium quemcunque abscessum facere potest, quando ut ait Galenus lib.1. Epid.com. 2.tex. 75.ex venis & interioribus visceribus, ad exteriores musculos humi res acres perseruntur, ut solet per lassitudines, & alias ingentes caufas procatarcticas , que ut iftas febres mali

8 DE FEB. MALIG.

mali moris, fic istos fallaces rigores valent efficere: tum quia in hac febre ex cute pottus, & perspheria corporis ad venas maiores, & viscera interna facilè transferuntur maligna seminaria, que acri & venenata qualitate rigores excitant.

XIII.

Alterem ex præfiantiffimis fignis à facultatis lesione sumptum, PVLSVS cst, qui apparet frequens, parvus, debilis, & cui agualis, licet magis circa macularum exitum, quandoque connaturalis, aut parum ab eo diversis, ex inequali nimirum cordis affectu, ur ait Galenus, lib. 4 depræfag, ex pulsibus cap. 4. quod tandens monet inquietudo, anxietas, inordinati sudores, nullum levamen, & alia, quæ non consistunt cum pulsu bono.

XIV.

Apparet sepissime pulsus ab initio sormicanti similis, varius, & intercedens, ole espian venevos materia, aut virium defectum. A plenitudine sola, qua caret malignitate, non potest produci talis pulsum ataxiasine qualitatem tantim estici, qua inter magnitudinem, & parvitatem repetitur, maligna verò plenitudo omnimodam inaqualitatem, & ordinis perturbationem parit.

În ista rerum confusione sepius elucescit fallax fpes, fit pulsus optimo similis; non eft fidendum iis,quæ præter rationem eveniunt. Ad primum morbi infultum cor refiftit, & à fe cirus expellit, ad fecundum, aut tertium succumbere cogitur:Fit etiam transeunte putredine ab humoribus in. folidam cordis fubitantiam, facto iam in habitu morbo, qui prius erat in dispolitione . In smili rerum dolofa quiete attendite ad fingula figna, que in hac febre folent observari; nec minimum contemnatur : Ad respirationem præcipue, que 6 for fan fuerit frigida , aut fetida , aut inaqualis brevi reverfuras angustias præjagit. Estote cauti in prognosticando.

XVI.

Aliud fignum corum, que funt in venis, prestantissimum, & à naturali facultate desumptum est VRINA, que ut in omnibus febribus; in hac presertim venit attentius consideranda: Non minorem etcenim inconstantiam; & saliacem varieta, tem sequitur, quam pulsus. Bona, & simillima sancrum minis in principlo perseverans, malignitatem febris indigitat; quia venenosa qualitas, & interior est, & paulatim agit citra manifesam humorum perturbationem; maius enim est venenum; quod clam operatur, spiritus sorsan invadendo.

DEF EB. MALIG.

dendo, diversa, & graviora efficiendo acvidentia, quam per urinas demonstrari queant, quam putredo quæ vrinam, immutat.

XVII.

Hoc est, quod acutifimus Argenterius supè observaverat, cum persectis nimirum coctionis indiciis, homines in febribus malignis periisse; quod sit exigua in illis excitata putredine, & propterea exiguo calore in illis accenso, qui concoctionem turbare non potess. Itaque tales perire, non obsebris ve chementiam, sed ob; malignizatem, que pulsus, appetentiamque primum perdit, & paulatim alias actiones invadit. Hac ille comm. ult. ad lib. 2. Galiart. medic.

XVIII.

Sed frequentius, non tamen necessario ; utaliqui perperam putarunt, mox apparet crass, turbida, subiugalis dum meistur, et intensioris caloris conturbatum, et crassumam putredinem, effervescentiam, et conturbationem humorum; item maximam sacultatis naturalis impotentiam; præsertimsi igne non clarescat, aut post tempus subsdentiam non faciat. Hoc experimento vel ingentem humorum malignam ebuslitionemyes se exonerantis uature robur cognoscetis, si expulsione convenientem perfecesit; sin minus, irributum

21

tum conatum, qui non minus pravus effe.

XIX.

Hinc post pravam huiusmodi urine conditionem, eiusdem suppressio aut diminutio subsequi solet, malitiam, pravum morbi morem ostendens, succos in nobiliorem partem detrudentem, aut natura ingentemiacturam; nisi ea sequantur utilia, qua ab Hippocrate & Galeno adnotantur lib. 6. Epid.comm. 1. text. 10. Ante rigorem suppressiones urinarum, si exutilibus sueriur, & alvus processerii & somni adsint. Forte autem & sigura febris, forte autem & qua exlassiudinibus. Sed rarò in sebre puncticulari hac utilia sequuntur; nimis enim lacessita veneno natura, si ab vno incepto cessuerit, aliam. 10 evacuationem criticè, & laudabiliter vix persiciet.

XX.

Crudæ etiam, & decolores ab initio apparentes, fi quid aliud couiungatur pravotum fignorum, non minus hanc febrett. oftendunt: Quandoquidem paulo post incipiunt apparere subiugales, non incipit tunc pulieris febris, sed talis à principio suite, licet servicem suum statim non oftenderit: Seminaria enim contagionis nondum ad viscera se receperant; postquam verò interiora attingunt, & in viscera penetrarunt, ob distribum servorem,

O

DE FEB. MALIG.

& agitationem, multos ac turgidos flatus elevantem, urinarum perturbatio fequitur,

XXI.

Præterea dum tales funt, quandoque fubitò & derepente folent apparere coctæ, An huic inconstantiz fides erit adhibenda? Minimè certè, immò maligni morbi certifimnm indicium: Paulo poff enim recrudescant, mapadoyws coquantur, nullis antegreffis coctionis fubobscuræ fignis . Certum enim eft , in morbis valde malignis, & fub mortem natura ceffante, aut extremos conatus proferente, aut morbo in aliqua pracipua parte, & extra venas existente, utinas apparere vel melioris coloris , vt in Philifco , lib. 1. Epid. fect. 3. agr. 1. vel cum enzoremate, aut nebula. laudabili , aut hypostasi aquali , & alba,ut in Sileno , lib. I . Epid. feet. 3. agr. 2. à colliquatione, que proximè accedit ad veram hypostasim, aut humoris alimentarij effufione natura refoluta, vel denique tantula parte materia cocta, cum reliqua vel contumax, vel maligna fit, id accidere, Sed fallacis huius coctionis dolum facile prodet, præter nullum levamen, odor depravatus ipfius urinæ, qui cum bona coctione non congruit, imò fordidam putredinem demonstrat , & extremam perniciem mis natur.

XXII.

Inter mox apparentia vnum adhuc el

PETR. A CAST.

in urinis fignum valde horrendum, & quod hujus febris malignam, & diffolventem putredinem indicat , colliquamentum niin rum supernatans urinis,pingue aut oleofum , aranearum telis fimile, iridis colores repræsentans, ut in aquis uliginosis & stagnantibus, aut melius in collis columbarum observanus; quod in Patre Balzio vidiftis . Hoc malignam , & venenofam putredinem (nam in iis , quibus venenum_ exhibitum eft, pariter conspici folet] indicat : Illud calorem exurentem , & colliquantem corporis substantiam . Itaque si substantia hominis ex colliquatione defluens tenuis fit in venis, & renes valeant, ad urinas convertitur; fin craffior & qualis à renibus trani nequeat, tota in ven-trem, & intestina necessario confluit, & dejectione redditur utplatimum fetidiffima, & non raro pingui & oleosa, ex qua fordida humorum corruptela arguitur'.

XXIII.

E confluxu isto humorum in ventrem oriuntur alia signa, que hanc sebrem non obscure indicabunt. VOMITVS nempe, cibi sastidium, sitis ingens, & lingue ariditas: Solent ista cansones, & alias sebres comitari; sed vomitus frequentes, exigui, morbum non solventes, ut quacunque alia excreta semirepentia, malitiam pra se se-runt; & facultatis impotentiam; ut lib.; Coac, sest. 3, t. 8, Quod certè in eis, qua

24 DE FEB. MALIG.

in febre pulicari fiunt, vacuationibus sape vidistis, ac multo quidem melius, quando prater succi quantitatem parvam, pravitas accedit, ut bili vitellinæ, fulvæ, porracæ, autæruginosæ, quæ per suos gradus ingentem humorum adustionem significat, ac proinde morbi malignitatem, ut l. 2. Coac. t. 26. Hippocrates; eò magis; si iu progressi morbi fiant, ut testatur Simonis Historia. 6. Epid. sect. 2. text. 23,

XXIV.

Ob eundem fuccorutu in ventrem confluxum, & malignam eorundem circa os. & corpus ventriculi putrefcentiam, prodit in hac febre ingens CIBI FASTIDIVM, & abominatio ciborum infepambilis: quod procedit non folum ex febrili colore, fed ex maligno & halitu peftilenti vires fentientes illius partis adeo profternente, aut etiam fi vim fibi faciant ægrotantes, non posit, aut protinus nausea, aut vomitu frequentissimis infesentur, agitata magis per cibum sordida putredine.

XXV.

SITIS INGENS, & febrili calori improportionata, non folum exurentem calorem arguit, fed potius malignam baus febris putredinem circa ventrem fieri, quandoque panca aut nulla fitis cum exuftione excellenti. Adeò gaudet hoc monfirum ftrum symptomatum disparitate, vt nullum certè magis pathognomonicum huius mali signum sit, quam nullam in signis servare rationem, nullam concordantiam aut ordinem. Dum igitur longè à ventre humores putrent, aut frigidam crassamque naturam fertiuntur, aut maior putredo prope cor viget, moderatior sitis, quamvis exuri videantur, frigido aere magis recreantur, quam potu, quod dicebat Hippoctates, & vensum cum potu frigido introducere, 6. Epid. sect. 29.

XXV I.

Sed cum ingenti ista siti,& irreparabili ciborum aversione hoc unum sepe coniungitur, quod, nullo ferè excepto, in cundis febre puncticulari correptis semper hactenus observavi, ardentissimum vini defiderium, vt continuò vinum expoftulantes lacessant, viri alioqui temperantes, & modesti . Provenit hoc mehercle à corde lacessito, & prauis ac venenatis vaporibus oppresso, requirente auxilium, quod ipsa natura duce cognoscitur ad regenerandos deperditos, ac malitia confumptos spiritus aptissimum. Nec minus diligenter hoc annotavit Iordanus Tract. 1. cap. 19. de pestis phænomenis, dicens: Neque ullus visus morbus, qui tantam vini hauriendi voluptatem desiderio inexplebili consunetam, ac ifte introduxisset it aut pracipi-tes cum vino necem appetere prudentes & Scientes viderint .

DE FEB. MALIG.

LINGVÆ ARIDITAS, nigredo , & scabrities, que dictam à pectore fitim co-mitantur, inter præcipua huius febris figna iure merito habentur, tum quod lingua lotium fignificat , & pariter aduftio. nem ingentem fuccorum in venis oftendat, tum quod, dum eft fine fiti, malignam qualitatem vim oris ventriculi, & faucium fentientem ademisse, cum non parua animalis facultatis iactura argumento fit . Hinc taliter affecti iam non fitiunt, aut non fentiunt fe fitire, fed dum iam mensincipit fatifcere , fentiunt quidem se circa fauces quali funibus propter nimia ficcitatem , trihi ac divelli . His in morte (ait Hippocr. lib. 2. fec. 2. Coac tex:46.] Spiritus , quasi trabente aliquo redditur , Quod in monacho in carceribus moriente observastis .

XXVIII.

SVDORES inter excrementa si à principio parce profiliant, sint frequentes, inordinati, varij, setidi, huius sebris certe malignitatem significant, que naturam opprimat, striter, ac impotentem reddat: Lassata namque & defessa dusta cum immani & venesico hoste, per quam sudores hujusmodi ex defatigatione prorumpunt, molestius deinceps, & difficilius novum humoris maligni irruentis infultum sustant, unde reliquum est, ut fermè. Esto

modo pestilenti hydronoso succumbat.

XXIX.

Pari evacuationum femirepentium, & imperfectarum conditione STILLA SAN GVINIS ferinam hujuş morbi naturam oftendit, quod fignum non folum in hac febre, sed in reliquis ardentibus & malignis ab Hippocrate observatur lib. 3. Epid. com 33. & 1. Epid. comm. 2. 26. Nec stil-Iam adeò ffricte, & scrupulose quæratis, Cape ad quatuor , aut quinque uncias , repetitis conatibus, nunquam perfectis expelluntur; quod nuper in Patre Clodio observastis. Oh! quoties Hippocrat. Pauca apparere, veluti stillas sunguinis, urinam, vomitum, & excrementa alvi, omnino malignum effe dixielib. 3. Conc. f. 3. 81, duorum enim alterum subeunt, vel quod non queant ob copiam tolerari, vel quod imbecillitatem oftendat, qua quidem proponit superflus excernere , sed nequit, lib. 4. acut. 67.

XXX.

Frequens HORRIPILATIO

po o po dictam emulatur, imò cum
ea cape conjungitur. Qui frequentibus à
dorso, levibusque horroribus desudant,
dississi morbo loborane, 2. Caac, 8, aig
Hippocrates. Hoc symptoma frequent
igordinatum, & adhuc vigente morbo

B 2 pere

·44 :

perseverans, sit ingiter ex halitibus venenofis a fordida patredine elatis, qui tam funt mordaces, & à natura alieni ,vt partes fentientes cos omnino averfentus acrenuant, & tanquam venenum expellere conentur; quod in aliis febribus putridisrarò contingit, in quibus intentio caloris viget: in hac malitia cálorem superat, & venenositate potius peccant succi, quam putredine. Quid fi à feminariis fe per poros cutis infinuantibus, & natura recalcitrante fiant? quidni? Cavete horrificam febrem iudicetis, autillis apparentibus, febrem continuam folutam iri pronuncietis.

XXXI.

Vltimum in naturali facultate agnum MACVLÆ su t, pulicum morsibus similes, à maligna sanguinis effervescentia, & fuccorum agitatione facta, nihil cutem in tumorem elevantes, fed veluti fi quis atramenti puncto carnem inficiat, tempore restino . & stragulis aut cubili non adeò mundis, facile est decipi pulicum morbus: Non enim sufficient symptomata aliasquas febre convincant, etiam accidentibus pravis correptos possunt pulices pungere. Praterea tempore exitus macularum, colore, & numere, multa rimantur, que faciunt ad prognosim, Quapropter diligenter maculæ examinande: Farina Lupinorum aceto aut oxymelite fubacta, illitaque ftatim pulicum puncturas delet , non fic pepestilentes peticulas, que ut à principio interno emanantes radicitus inhærent, nec cedunt experimento.

XXXII.

Hæc igitur in hac febre perniciola 2. principio efflorescunt , fed quarto , quinto, fexto, feptimo, aut quod tardius, nono , aut 11. apparent, potissimum in. dorfo, potius quam in thorace, quamvis primaria fit cordis affectio : Ratio eft,quia ductus arterie gorte, & vene cave dorfo inhærent, quapropter facile in dorfum profilit damnum quodvis in corde. & ejufdem vasculis hærens : In alijs febribus folent observari , fed mitioribus flipatæ symptomatis, sape cum synocho, non raro cum tertianis tam continuis, quam intermittentibus, imò quidem citra ullam aliquandò febrem fefe exonerante natura... Quapropter nolite absolutum febris malignæ pathognomonicum hoc fignum pronunciare, & in discernendis malignis maculis à benignioribus estote prudentes.

XXXIII.

Nec tamen semper epigenomena apparentishae exanthemata, folent quandoque morbum pranunciare, prasertim si apparentia brevi evanescants ut contight Eiphranoris filio, 5. Epid. text. 92. eui exanthemata velut morsus culicum, exigentation exi

Juum autem tempus, postridie sebricitavir. Vt enim succedentia malignitatem significant, pracedentia ingentes morbosos apparatus ostendunt; & ad ingentes morbos dispositionem non levem; co magis, a breui euanescentia; non paulatim resolutum, quod in cutem emerserat, sedpotius in altum reconditum esse indigitent:

XXXIV.

Quod vero ad rationem infeparabilis figni magis accedit, hoc unum est ex læsa facultate animali desumptum. NQVIB-TVDO, & iastatio per lestum inrequieta; cum anxietate quandoque; & morsu oris ventriculi: que gravissima symptomata... innam eandemque causam babent, & unicè hanc sebrem mali moris detegunt; slavam feilicet; mordentem atque irritantem bilem in ventriculi tunicis contentam; Attamen ets omnis generis lassitudinisus defatigati conspiciantur miseri languentes, rationem tamen reddere nequentes oloris siu; quia maligna causa citra manifessam qualitatem agis.

XXXV.

SYNCIPITIS etiam dolor acutus & molestus præbet huius sebris indicium, eo magis, si aliud quodvis malignum signum consocietur. Illum esticiunt maligni halitus setiam a morbi principio caput petenteis. tes, tanquam a prava, & maligna putredine eleuati, idéoque ægrum reddentes mæflum, ac vocem deficientem, propter eam quam ipli inferunt imbecillitatem.

XXXVI.

Ab eadem caufa, bile scilicet ad caput evolante, aut malignis, ab ea maligne putrescente halitibus, funt INTENSÆ VI-GILIA, que in hac febre per totum acceffionis decurfum perfeverant, cum in_ aliis putridis folum crefcente, aut vigente febre appareant - Præterea fi aliquando fomno corripiuntur, turbulentus elt , & variis ac interturbatis infomniis rac phantafmatibus plente, ab eo male fe habent s & laboriose expergifcuntur , femideliri ,etiam à principio morbi . Decipiuntur aliqui , cum videant ægros flatim refipifcentes , dum spirituum motu diffipatur caliginofus ille & craffior halitus , exiftimantque iplis hoc elle connaturale, & affuetum per fomnos loqui. Cavete, iam hoc non femel obseruaftis, rimamini omnia, videte an intensius à sonno febricio tent, an sitiant, aut corpore toto doleant, ac confringantur .-

XXXVII.

coma non minus molestare folet hac febre correptos', quod etsi utplurimum? illam puncticularent sequantur, que pitui-

XXXVIII.

Proteres INSOLENS TRISTITIA 20 grotantes corripit, ut moefti fant, averfentur domefticos, interrogati tardiùs refpondeant, convertantur ad parietem; timor præterea ingens viros alioqui fortes viliter occupat. Quod fi ager timuerit. tu time , dicebat Auicenna . Difcite hine nihil contemnere : Melancholica. funt ista, & humores prava putredine correptos indicant, halitibus à melancholico fucco fordide putrefcente mentem obtenebrantibus, timor, triffitia, de jectio animi, mentis inconstantia, & quandoque comitiales accessiones : Melancholicos namque fieri epilepticos facile eft , ut 6, Epid. notavit Hippocrates .

XXXIX.

Quapropter non semel observavi, præredente nempe tristitia, subsequi nonsolum folum capitis, sed & brachij tremores præcipue dum pulsus tangitur. Hoc quoties ita sit, ad succum aliquem insectum atque atrum, ant pravas quasdam malignorum succorum in cerebrum demandatas suligines, à quibus ipsum afficiatur, & infirmum reddatur, referri sine dubio poterit. Qui ad manum ressiliunt, in malo sunt dicebat Hippocran Coacis lib. Lit. 24. Prorthet, appositissus mous issus deservatorum poudose appellans, extremore nimisum, convulsione mixtos.

Х L~

Nec ANIMI DELIQVIVM fæpius per initia morbi eveniens huius febris naturam obscure demonstrat: Hoc utplurimunt observatur primo morbi insultu, vel seconda dic , aut tertia, præfertim dum forgunt agrotantes, ut egerant . Accidit hoc propter putrescentem , & acrem bilem à ventriculo ad cerebrum evaporantem , vel propter humorum in colo intestino malignè putrescentium agitationem, quod quia pracordia, & Romachum perreptat , huic exquisitissimo sensu prædito facile paffiones impertitur, ande flomachico deliquio sapè concidunt ægri, in fella alvum dejicientes; Nam fyncopen, que visceris vitio & ratione fiat , cordis & arteriarum defectioni adscribitur . Si talem aceidere contingat , grauius certe & violentius iam malum eft , & ferme pestilens , brevi fun-

34 DE FEBR. MALIG.

mos habens labores, & vitam tollens, Stod machica syncope licet non adeoviolenta; aftuosam tamen, & malignam febrem ut plurimum fequitur; quod hb. 1. de arte eur. ad Glauc. c. 14. notavit Galenus his verbis: Sed & in principiis febrium non admodum paucarum advenit; & tunc prasertim; cum supra modum aut siccum; & squalidum aut plenum immoderate corpusexisterit; & nonnuaguam estam smul cum febre incendence atque malisgna inuasit.

XLI.

Denique non eft prætermittendum fignum , quod licet non adeò frequens accidar, eft tamen magni momenti, quod aliquando observavi in principio hujus febris non fatis adhuc manifesta: DOLOR gravis, vel'acutus, quandoque flupiditas diredain sin aliqua corporis extrema parte crure, tibia, pede', aut manu', breui difoarens, malignitatem certe hoc arguit; qualem Caluo Larif. 3. Epid. fec. 3. agrat. 5. Critoni & Clazomenio agrotis. 9. & 10. lib.i. Epid.f. 3. quorum historiis admodum fimili , & pari accidentium , ac exitus infaulta forte nunc observastis sublatam no-Bilem Veronensem, Margaretam Bezeliam'. Dum hæc fcribuntur , mulier que. dam Montagnanæ hac febre corripitur, & flatim lecunda die incipit conqueri de acutissimo pollicis dextri pedis dolore, qui intra horas 24. agrotantem de medio fultulit ; Oculati testes sunt medici ejus loci peritissimi; collige causam ex tex. 12. sect. T. libri 2. spid. Temeni nepti ex morbo forti ad digitum decubuit, qui cum non sufficeres ad suscipiendum recurrit y mora tra est.

XLII.

Sic in iis, quibus olim exhibitum sucrat venenum; post multos annos derepente exertus dolor in patter aliqua extrema liomines extinxiti: la hac febre pariter virus adhuc delitestens natūram in abstondito lacellit; irritat, prosterniti: illa lacestita; pritata; prosterniti: illa lacestita; pritata; prosterniti: illa lacestita; pritata; prosterniti; conatur expellere ad ignobiliora loca; incipit motum; nec potis est perficere: Semire-pens pariter eth iste motus; pariterque infausti judicij; se exitus infelicis. Non sie in sine morbi; in quo dolores in aliqua, parte six absocium vicem subcunt, benes, leter imperfecte judicantum.

XLIII.

Non raro tamén in fine morbi adeo pertinaciter firmantur in membro aliquo acerbiffimi dolores, veneq: refolutionems, neque fuppurationem attingentes peccantes fucci; nullis quibufeunque demulceriqueant anodynis, fed post longos cruciatus, vel in offis corruptiones, vel in parti exuccam atrophiam miferè terminentur, utracidit fabro lignario, quem post febremali moris, quatuor mensibus continuis adeo serox cephales vexas ut iam oculum alterum amiserit, nec immunis sit adhue assuments, nec immunis sit adhue assumentios seroniti canij, aut vermis pernicios subtus latentis, a pravitace lumoris geniti: quod sepe visumest, & post Rhazim lib. 1. continuoto. & Auicennam tract. 2.c. 3. cant. observarunt Ioubertus, Hollerius, & Volchorus Coiter, Autores egregij.

XLIV.

Denique, & hoc inter figna irritatæ facultatis accipite, quam multis nimirum ac variis modis simul tentare naturam & morbo fe expedire. Vidifiis me curantem mulierem , que octo dinersis evacuationi. bus judicata eft; lunari feilicet, narium hemorrhagia, puncticulis multis, & fatis pravi coloris, veficulis quibufdam carbunculorum naturam redelentibus, fudoribus multis, largo deinde urinæ fluxu, crebiis ac vitiofis deiectionibus, ac tandem parotidibus suppuratis zi, judicata eft , tot lu-Stas egregiè fustinente natura. Sed videte, ouid scribat Galenus de bonit. succ. cap. 1. Quibus (ait) nibil borum accidit, interiere omnes , ut postmodum fæpe observaflis .

Pluradhuc possent receseri signahujus truculentæ sebris; sed ista sunt magis propria; quæ tamen non oportet omniasimil adesse: sussicit medico aliqua conspicere, ut certam rei naturam vaticinetur.

De fignis Prognosticis! Febris Puncticularis.

SECTIO IV.

I.

Signum unum optimum non sufficit, etsi fit pulsus, aut urina, modo alia perniciosa existant.

Nec fat est unum signum falubre este., exteris veluti nihil boni, aut mali mon-

ftrantibus : quia fuspecta res est .

Nec fufficit plurima ex fignis prauis delitefcere, aliquibus adhuc perfeverantibus; quin potius loc perniciofum fæpe eff, docet namque facultatem illa ex parte effe fubverfam potius, quam morbum debella; tum.

Ħ.

Vnum ex multis signis pravum in necando ægro plus virium habet, quam plura simul bona in eodem liberando; quamquam inter signa gravia ac lethalia multos euadere. Hippocrates observat in Epidemijs siquibus tria hæc potissimum integra, & inculpatasuerunt, pulsus, respiratio & appetentia, quod ad falurem magnam vim habere comperiantur, ut Galenus annotat in historia Heropiti.

III.

Denique in hac tebre pulicari, & alijse pariter magnis, & fuapte natura lethalibus morbis fic flatuendum; unicum pravum figuum multis bonis anteponendum effe, utan mitioribus morbis vnicum bonum, multis pravis.

IV.

Pravint', & valde perniciosum signum? est marbium moveri per pares; quoniam infinita alia perniciosiora signa secum affert', ex se tanten longitudinem significat.

Quod si simul statim motibus habeat extremos labores; & videatur breui temporis spatio transigere velle sua tempora sinasguem maliguitatem; & sagrotantis suinam minatur. Videte supra Aphor. 7. sectionis 2.

V.

Sed inter pessima hujus morbi auguria , & illud pontte [quod' in praxi vobis nimium continget :) remedia à principiofussife neglecta . In acutis enim cadem die adhibenda. Nam in talibus tardare malumesse, dicebat Hippocrates : Vinde multomagis in venenosis, & hujusmodi-pestilentibus veniet-observandum.

VI.

Primum fignum fit, morbum effe adfri-

chums aut conclusum in principlo, aut aut gmento; non malum : Quacunque enimi concoqui oprenet , occludi convenit; constraria autem siccari & aperire, 6. Epid. fect. 2: 1.24. Hoc fignificat naturam vincere , non irritatam morbi malitia; maxime si non adstructa decubites humorum ad caput. Verum vigente morbo nihil excernit malum est.

VII.

Secundum fignum, fudores, etiamfi continui fint cum virium robore, fæpe folent morbum finire

Qui vero alternit & criticis diebus, non femper boni, quia crassities humorum remanens cum venenosa qualitate sepe in-

terimit.

Præterea li suerint sætidi, varit, inutiles, inordinati, stequentes, parce in_s principso morbi profilientes, malum utplurimum portendunt, ut ait Hipp in Coacis. Exsudantes, vigilantes, & recalescentes;

VIII

A principio largiùs sudare in febre punfliculari bonum est : [licet in aliis subțacere videantur sudores in principio, universali judicatoriorum non judicantum regula;) sudore enim ab initio tollitur mali fomes; a abblentur contagionis seminaria; ut non possit pessmodum latius propagari insectio.

Non

40 DE FEB. MALIG.

Non sudare autem incipiente sebre, & nuper agglutinatis seminariis, & contagione auca, ets nullum aliud secum habenet malum, hoc unum satis soret, quod seminaria ipsa, qua quidem ex natura sua consimilia aggenerant, & multiplicant, conclusaintus ac detenta magis ac magis in dies, & sebrem, & putredinem augebunt, adeòut postmodùm maximo sine agrotantium discrimine destrui pon que-ant.

X.

Contra in statu morbi sudores sunt perniciosi, & specum eis laborantes extinguanturs propter facultatis solidarum partium imbecillicatem, à quibus non poterunt humores elaborari ad persestà crissuexspectandam.

XI.

Madoribus, & vaporis calidi per universum estluvio maios pars haz tempestate peritts precedente in multis frigido è nasibus spiritu, ut heri in piscatore observastis, qui sub sinem septimi vivendi sinem fecit. Sign. lerhalia, dicebat Hippoc.per cutem calidus vasor, prius ausem nasus frigidum spirirum reddir. Exiguus namque calor, 6. Epid. sect. 4.t. 26. vorantis malignitatis reliquire, qui se intia cor receperat, calida eusporatione exhalans, emo-

riente

riente fimul corde, dissipatur; unde in carpis pulsus non percipitur, ut huic piscatori, cui per diem ante mortem omninò delituit.

XII.

Tertium fignum ALVI FLVOR inter initia prodefi, quando humores plus venenofa qualitatis, quam putredinis habent i quia venenofa qualitas coctione non corrisgitur: Si vero plus sit putredinis, nunquam alvi fluxus, nisper coctiones falubet exissit. Cognoscetur autem plus vigere, putredinem, quam venenum, quia sebris intensior est pulsus maior & vehementior, & qui facile dilatatur; contrario vero mo, do, ubi venenum pollet.

XIII.

Subalternatur alvi fluori Vermium extulfio, etiam fi fepiffime per vomitum rejiciantur, ut est in hac febre horum animalculorum ingens proventus malignorum fuccorum foboles. Si ante feptimum exeant, grave malum minantur, putredinem ingentem, & calorem ingenum predominantem. At post feptimum, apparentibus aliunde signis cottionis, folent critice & bono omine expelli, non jam violentia, mothi, sed vi nature. Pronuncianit Hippoc. hane prognosim his verbis Aclumbrices quoque teretes, eunte in indicationem morbo, descendere una cum dejettione,

idoneum eft . lib. 2. Prognoft . 18.

XIV.

Crudo tamen adhuc existente morbo ; eth diutius protracto, stachtsque admodum viribus; excerni omnino extriale est: Estugiunt enim ; non minus quam pediculi; difpositionem in ægrotante cadaverosam; quod notavit Scaliger exercit-contra Cardan. 246. t. 4.

XV.

Præterea enecatos expelli è corpore, salignioris affectus effe indicium voluerunt nomulli: Nos alibi cum Avicenna, a Rhafi statuimus, cum ex materia, tum ex accidente maligniores esse morbos, per quos hæc infecta vina expelluntur, quam enecata. Ignis lambentilib. I.c. 6. in calce.

XVI.

Quartum fignimi. In hac febre circa urinam ifta præfertimi veniunt pro prognoficonfideranda, vrina que craflastubra, pitti-& tur bida perfeuerat, pericufofa.

Que subito colorem & substantiam mutat, mala, decubitum enim humorum adaliquod membrum princeps demonstrat.

Tenuis, & que subitò plurimum turbatur, maximum servorem indicat, &peridculum minatur.

Fætida grave malum fignificat, excel-

lentem putredinem cum malignitate con-

junctam .

Mala etiam est; & serme lethalis; que circulum habet variegatum; aut coloratum.

Subita urine mutatio ad bonum , aut ad

malum , fufpecta .

Sedimentum simile farine, periculosum. Sedimentum ; qualecuuque sit; si appareat; se delitescat; malum ; laborem; muitationemque significat; lib. 3. Coac. sect. 3.1.64;

Imminuta urinæ quantitas, maximè cir-

ca statum, aut eius suppressio, mala.

X V I I.

Quintum ignum: Pullus æqualis, & fenorem fervans, bonus; inordinatus, inæqualis, contractus, præsertim si a principio debilis appareet; malus, ex Hippocrate libit, prædid. & lib. de Coacis prænot, Qui preter rationem; nulla existence vaforum inanitione; impotentes sunt, malum;

Observatur etiam non rato in hac sebre vitalis facultas omni vitio asseda; & crebris intermissionibas intercepta animali potentia ab omni lassone immuni; pessimun; & lethale signum cst; venenum quidem ostendit; & pravam putredinem, qua ad mixti dissolutionem breviter tendat.

XIIX.

Sextum fignum & Circa macularum pro-

gnofim quinque vobis erunt confiderandas tempus nimirum , color , locus , quantitas & excundi modus.

Que nunquam apparent, nunquam iudicationis, fed fymptomatis ratione femper exeunt, semper infausta; & plenæ periculi

funt æftimandæ.

Que tardius , circa nonam , aut 11. feilicet, non mirais perculosæ . Cum enim humorum craffitiem, & cutis fortem conflipationem oftendant, tenaciùs adnærere malignitatem, & putredinem maiorem, indeque ægrotantis ruinam minantur.

Neque omnino funt fecura, 67. appte ruerint, nifi fimul ex febris fimplicitate, & coctionis fignis, aut mitiori vifcerum agitatione , & feruere processerint : Sin minus , perniciofe , idque potifimum , fi cum delirijs faccedant.

XIX.

Circa colorem : que rubræ funt, mitiorem effe febris caufam, nempe fanguinem, indicant: Sic puniceas excerni, iam quodammodo affari, & uri fanguinem ; atras verò, prorfus exaffatum, atq; uftum efle; veluti violaceas, & lividas calorem naturalem extingui, atque omnia pessum ire. fignificat. Huc referte liuores, qui in dorfo folent apparere, circa ftatum, & in principio ipfo; & incisionum, que per cucurbitulas fcarificatas fiunt, labra liventia, aut nigricantia fieri , mortem certo indicant:

cant: Cujus sidem saciet celebris illa lues Moravica; de qua Sporischius elegantissime, & ex Galeno, libro de bonitate succoum, restè colligitur, dicente, ex vena secta sanguinem in his sebribus exire, aut plus iusto rusum nigriorem, serosum, aut acrem vulnus inter sluendum mordicus vellicantem, ut ægrè inde ad cicatricem duci possit, &c.

XX.

Circa locum ista perpendite : In pedibus, cruribus, natibus, & lumbis apparere, melius est.

Sic peius circa scapulas, & dorsum, & circa anteriorem pedoris, & sterni partem profilire, majorem anxietatem ostendunt, & natura majorem oppressionem, & impotentiam.

XXI.

De quantitate Fracastorius deterius esse se sautitus, si plures appareant macula, ac salubrius, si quam paucissame, neutra pars vacat periculo: Nam licet summa eum ratione vereatur. Vir insignis tantam subesse venenosa causa copiam; quod necessarium situit magno conatu natura copiosam moliatur expulsionem, imminereque periculum, ne tanto malo oppresa succumbat facultas: Attamen pauca, si aliis prauis signis associatum natura motum, & expulsicis imbecillitatem.

Denique

DE FEB. MALIG.

Denique circa exeundi rationem fice prognosim elicite. Si egrè exeant, vel maximè dispersarepullulent, non ex toto secura pronunciate: Sic si sora iam expulse, intro iterum retrahantur, aut regrediantur, se quod sepe sit, se administratura non este potentem, aut humorem, non fatis obedire expulsioni, aut alias evaquationes per loca minus opportuna tentare naturam, ut Simoni, cui vomitus adeo malè conferchat vnctione vero & somentis invabatur. 3. Epid. com. 3, 34, ac proinde à circumferentia ad centrum regredi venenos materiam.

XXIII.

Ex facie Hippocratica mortem pradicere non novum est: Affabre delineavit illam Divinus Senex, & quantum ab illam Divinus Senex, & quantum ab illam Electrometudum, nos docuit; magnum in hacfebre locum obtinet. Rem tamen admirandim; & in nature adytis reconditam, intastam reliquit; quam ex posteris fere retigerit unus autalter. Audite: Quicunque maligne febricitantes facie reprefentant atavos, aut parentes; cum antequam agrotarent; illis minime assimilarentur; omnes extinguuntur. Quod mirabile est observatum nuper in quodam Engerranosilio, qui cum non estet vultumatri

matri fimilis, illius tamen facies ante obitum ita proprie maternam repræfentabatut omnes fuperent. Difcite hinc, quam vere aliquid divinum lateat in morbis.

XXIV.

Lingua in hoc immani morbo, si que alia corporis pars, vobis loquetur, vel faustas, vel infaustas prognoses. Perpendice, que apud Hipp. copiose passim exarantur. Ex eis hoc unum inter multa colligite, ut mortem breui subsecuturam certo pronuncietis: frigiditatem nimirum lingua actualem, que in his sebribus solet quandoque ad tactum digiti observari; in quibus presentim conjunguntur symptomatica e vacuationes muita, per quas spiritus & caler innatus sere ad extinctionem depauperatur. Signum est omninò lethale, nec nisi in magnis viscerum inslammationibus, aut sub mortem, aut in febre pessilenti, talis lingua apparent.

XXV.

Hanc linguæ frigiditatem, voluit fignificate Hippoc. fent. I. lib. 2. fect. 2. Coac. pranet. per hæc verba: γλωσα δέ κατ αρχας μεν πεφρικό επ &c. i.e. Lingua, qua in principio quidem inhorruit. Non existimetis horridam, squalentem, aut asperam intelligere, (hoc alibi infinuarerat:) sed frigidam actu, ut Dociss.

Tacotius. Etenim cum lingue mollitie, humiditate, & calore naturali folethoc fymptoma apparere, ut ex-multiplici observatione Simeonis Iacotij retulit Erudttiss. Riverius, quem legisse nunquam pænitebit.

XXVI.

Tremula lingua mentem non firmam fignificat, & fi nigra fimul fuerit, celerem mortem denunciat, lib. 2. Coac. fect. 2.1.6.

XXVII.

Lingua undiquaque subtus, ac in laterirbus arida, & quæ libere exeri nequit, sngentem ruinam minatur.

XXVIII.

Collidi, & stridere dentibus, innon consuctis per sanitatem, infaniam ostendit, mortemque denunciat. Si verò iam delirans, hoc efficiat æger, omninò lethale est.

XXIX,

Siccari dentes, lethale. Sic lentores dentibus insidentes pertinacis morbi funt indicium, & fortis sebris: Si vero glutinosa illa, que intersitiis dentium adhærent, nigricant, lethale.

XXX.

Respiratio frequens & parva inflamma-

tionem in logis principibus fignificat. Nullum in prædicendo præflantius fignum refpiratione. Difficilis, & frequens in hac febre femper mala, & mortem minatur; ut hac morborum graffante constitutione nimis clarè patet.

XXXI.

Circa fauces non tumentes irritationes parvæ, dolorofæ, delirium fignificant, & phrenitidem lethalem: Hoc nuper obfer vastis.

XXXII.

Manus tremulæ delirium minantur: Oppressis namque mole, aut qualitate succerum, nervorum ad manum pertinentium radicibus, merito timetur periculosa illa MATA pours, qua nervorum assectus spsicerebre communicatur, vt in historia Pythionis lib. 3. Epid. sect. 1. text. 1. Sed qui, dum pulsus contrestantur, manus retrahunt tremulas, quas vite sue timentes, alioquin sine ulla querela manentes quieti, nullo modo dormientes, aut nis interrogentur, loquentes omnes ad unum periestunt.

XXXIII:

Pessimum signum est & timoris plenum, cum sanguis vena scissa extrahitur, si purus, rubicundus, & inculpatus educatur, venegostatem superare indicium est, aut putredinem Aredinem in penitioribos cordis latitare. In me ipfo olim observatum, nam ter per fianc febrem fanguine per venam misso nulla prorsus putredinis nota apparebat, aliis signis immani serocitate seuientibus.

XXXIV.

Aliud non minus admirandum, quam lethale ac exitiosum ex sanguine elicito prognosticum, à pancis hactenus observatum, vel propter medentium incuriam, vel propter signi raritatem. Ex sanguinis scilic.extracti frigidis resqualis in glacie, aut nive percipitur. Solet hoc signum brevi temporis spatio mortem præcedere.

Estote diligentes in perserutando svel etiam minima. Resero experitiss. Riverio observ. 46. ex communicatis à Pachequo-

XXXV.

Sanguis per scarificatas cucurbitulas putridus illico apparens, perniciosym, jam serpfise virulentam putredinemiargumento est, & in partes solidas se ultro insinualie.

XXXVI.

Stilla fanguinis semper funesta, in principio, vel augmento, præsertim si quarta evumpat. Nam Philisco, Epamenoni, & Sileno, quarto & quinto die parum de nasibus distillavit, & mortui sunt. I. T. Epid, sesta, fect 3, text, 20. XXXVII.

Surditas tum bona, tum mala solet esse. Surditatem nuper observastis pessinam brevi evanscentem; una die circiter durantem; quæ sequitur alia symptomata, & in processu aut statu morbi, & perseverans, optima est, quia in eam degenerare alia symptomata signiskatur: & humorem in halitum fortasse eonverti. Hanc laudat Hipp.t. popul. sect. 3. agg.; 3. loquens de hujusmodi sebre, tanquam certum salutis præsagium, multos enamerans in Epidem, qui surdi evaserunt, ut in hist. Eropiti, & virginis decumbentis in sacra via.

Que verò pracedit, mala est, ut qua retrocedit, A furditate & torpore, sub-fillare sanguinem è naribus, nessio quid babet dificile, lib. de Coac. Fluxium sanguinis pranunciare solet ista sarditas, aut parotides, aut forte majus malum, ut in hist Hermocratis, & Philistis commentatur Galenus.

XXXVIII.

Fursuracea nigra è capite decidentia a lethale; caloris nativi extinctionem fignicat, & ab atra bile in universum prædominante hasce fuligines elevari indicio est. Non minus periculosi, quam si reticiatur atia bilis ipsa. Observavi nuper in adocturatia bilis ipsa. Observavi nuper in adocupia fursuris atri è capite in pulvinos decidebat, ut singulis soris toti veluti nigro

Lav.

DR FEB. MALIG.

pulvere inspergerentur ; post 20. extincus est.

XXXIX.

Horrenda Phthiviasis, ante septimum presertim apparens, maiore partem agrostantium misere sustulit : Nec protracto morbo semper est secura, nisi coctionis signa apparuerint . In declinatione salubriter solent germinare, consumptis per ea animalcula impuris succorum reliquissque ad cutem natura detruserat, non satis valens propter putredinalem visciditatem ab eis se expedire, alioquin perniciosas essentiales.

XL.

Somni profunditas formidanda. Et turbulenca cum ferosia excitationes mentem emoventes, mala, lib. 3. Coac. 9.

XLI.

In his febribus mentis emotiones taciturne in eo, qui voce privatus non est perniciose sunt.

XLII.

Sputum nigrum, aut pravi coloris, cum difficultate respirationis, lethale; extingui calorem nativum argumento est. Iam & hoc observastis.

XLIII.

Malorum denique fignorum perseveran-

tia, pessimuni signum. Nec mediocre periculum est, quadam ex malis cessare, aliis permanentibus; devictam natură argunt, brevique omnino casuram. Muita alia signa in dies in hac febre observantur, que longum esser tecensere. Perhustrate Hippocr, prognostica, Coac, pranotiones, & libros Epid propè aureos.

XLIX

Restat adhuc in præsagiis animadversso magni momenti, in qua folent naufragari etiam in arte peritissimi; in hac præsertim dolosa febre, in qua ægri sæpissime propè mortem melius se habent. Tunc estote oculati, nolite fidere iis, que prater rationem eveniunt. Percunte enim partium fensu, & cessante facultatum actione, misescere videntur symptomata, & hoc ipsum est ipsum mori, tantum abest, quod a re-Ra actionum dispositione proveniat. Accipite auream istam doctrinam ab Avicenna dicente: Quum homo babet febrem incenfivam, & invenit alteviationem, & quiesem caliditatis subitò absque crisi manifesta & quiescit, quod est in pulsu de velocitate, & invenitur ficut tranquillitas tune indica quod morietur velociter. 2.40 traet. I. c. 29.

XLV.

Infinita exempla hujusce fraudis, & incemendabilis doli habentur apud Hippocr.

54 DE FEBR. MALIG.

**Galenum. Puer convulsus in Hippologi villa, sees ante cenvulsione, sants videbestus, & special morbi die latenter morbi die latenter morbi die latenter morbi eritur. 18-4. Epid. text. St. Hermocrates letali morbo correptus, parlo post sine febres tum somno, & sant mente extinguitur. 18-3, Epid. sect. 1. text. 2. Sic apad Galenum, qui ob lassitudinem sebricitabat; vusus est 4. die bené valere, deinde septima vesperi cum sebrire capisses, tabesés sus obji. 18-5. Protrhet. sect. 2. com. 17.

XLVI.

Sed fi arrideant magis recentiores esfus : Medicus quidam Lufitanus primæ nota, Carolus nomine, inclyta civitate Co. nimbrita, quum in aliorum Medicorum Jodalitio agrotantem vifitaret ; quem pras cedenti die certo moriturum prædixerant, inuenientes illum aliis absque febre; cum pulfu bono, urina bona; lingua molli, fanum mente & bene fe habentem adioblaaa, latantur magnopère: Accedens fenior miratur; latere anguem in herba fuspica tur , contrectat totum corpus, nihil quod fraudem detegat percipit , præcipit præfenti chirmgo, ut digito interna recti intestini exploret ; an forte hamorrhoidum tumorem inveniat ; obsequitur chirurgus ; & vix intromissim digitum citissime retrahit safferens stanto ardore aduri interna; ut fustinere vix posset : Tunc fenex . fine mora contra juniorum votum mortem

intra horam, non sine magna artis laude ... & adstantium admiratione pranunciat.

ALVII.

Cavete igitur ab ifta Syrte, & Celli fa luberrimum consilium in caute præfagiendo fequimini. vbi , inquit , gravis metus est, sine certa tamen desperatione, indicare neceffariis periclicantis in difficile Spem effer, ne fi victa ars malo fuerit, vel fefelliffe videatur : l. 5. c. 26. Quicunque enim, ait Galenus, in hoc graviffimo negotio, in quo non folum ager, fed Medici fama, & honor periolitantur, in perioulofis morbis, plus, quam deceat , agrotantes. hilares, & bone spei plenos reddunt , io enulto maiorem conjeiunt trifficiam for quentibus diebus, quum aut in peius morbus cecidiffe videtur , ant ultra promiffe Medicorum producitur.com. 43.lib.6. Epid. fect. 2.

XLVIII.

Denique per quam evacuationem mefioricrifi liberatipossit ager; se perpendite. Per hamorriagiam narium nomullispauci tamen; indicantur; & omnes; quibuscunque apparuerunt stille, perfere. Nonbene pet hanc evacuationem educuntur
feminaria monti, frequentius liberantur
per deiectiones alvi; quantumvis parumoportuna sit ca regio ad seminaria educenda. Per sudorem præstantissima crisis; nec-

C 4 adeò

6 DE FEB. MALIG.

adeo laudabilis per maculas, quoniam non femper fecure. Per abfeefius non raro evadunt ægrotantes, de acuto in chronicum mutato morbo. Idero, fudoris adinfara, mon pauci liberati, post septimam erumpente. Vermibus multis eiecitis multi evaferunt, sed morbo ad iudicationem tendente.

Febris malignæ Puncticularis curatio

SECTIO V.

Ciberum quantitas , qualitas, tempus exbibendi. Potus genera magis opportuna ; & aliacirca Tysuvno examinantur.

DE VICTVS RATIONE.

1

Pere pretium erit in curatione gravissimi huius morbi a difficiliori Therapeutices parte exordiri: In ca enim fæpissime lethaliter erratur, quoniam vel negligitur, vel ab affistentibus & ægrotamte decipiuntur medici. Estote in hoc valde oculati, nam Philonis silia, quia septima die intempessivis cænavit, obruta est. 1. Epid. Hipp. sect. 3. adeò in acutis morbis vel quodlibet momentum, aut minimus error facit ad mortem inducendam. In vie du igitur quantitatem, qualitatem, & tempus exhibendi (qua etif facilia videntur, funt tamva disacillima ») diligenter perpendite cum Galeno, hib. 11. Math. cap. 3-9ui non levisimam magico, & dignissima artis nostra partem; scientiam ordinandi victus esse, jure merito-exissimat.

II.

Circa quantitatem, aliquantulum à comi muni Hippocratis doctrina hie discedite nec semper refpectuad morbi vigorem cibi metiendi . Habere quidem foles nec febris breviter extremos labores, fed brevius extremas exfolutiones: In renui vittu igitur agri delinquunt, quoniamin craffiovi , aut symmetro juvantur . Pundicularis hac febris, eth peftifera non fit, maligna samen eft, & quoquo patto cum pefte communicat , adeo us plerunque resolutis ob fuccorum pravitatem viribus, hominem ante septimum conficiat : Quod Gal. hist. 3. vulg. com. 3. rex-58. comprobatur , loquentis de quadant pelle fic : Fortiffime ergo rqui vim sibi ipsis adferences cibum oblatum assumpserant somnes fere superfites fuerunt . Vnde in febre pulicari (quantumvis illa acutior fit) ex victu parco, & tenui anguntur, & deficiunt ægroti, vigilant, & acrioramejunt, ac fæpe delisant ; & quod pejus eft, intus trahuntus mar

maligna feminaria, per inediam a nicribris externis fugente ventriculo; veluti, ab eo antea reliqua particulo trahebant: Ex moderato autem dormiunt, quiefcunt; & melius habent.

· III.

Quamobrem expedit , ne à principio imperetis multam inediam , præfertint in regro biliofi temperamenti, & corporis lizbitus ratioris, aftivo tempore; velirritatoriis laceifito symptomatibus, sudore videlicet refolutorio salvi fluore , hamorrhagia, & vomitu; animi deliquio, fyncope, & fimilibus, que omnia & fingula. funt diligenter perpendenda , ut victus ratio apte præscribatur, non solum ad vigorem morbi attendendo, sed ad vires, & ad præfentem morbi constitutionem. & symptomata; que febri superveniunt. Cum igitur virium gratia (ait Gal. 1. Aph. 9. er 10.)potissimum nutriamus, adeò vel in ipso etiam morb: vigore , (in quo tenuissimo victu utendum Hiproc.ait,] ubi casus aliquis intervenit robur natura dissolvens , nutrire nibilominus cogimur. In eis verò, qui in ventriculo, aut vicinis partibus copiam congerunt cruditatum , utilis eftinedia,tnec al ea patiuntur quicquam , & minus, si habitus corporis, vel febris fuerit pituitofiot, aut ingens plenitudo ciborum contractionem postulaverit : Aetius Tetr.2.ferm. 1. cap.119. Circa

IV.

Circa qualitatem', tales eligantur cibi , qui parum quidem alant , & contagionis, quo minus ad interiora irrepat , impetum coerceant. Eliminentur olera, & radices, exceptis Lactuca, Scariola, Buglossa, Scabiofa, Oxalide, que infenlis incocta, vel in acetariis; in parva quantitate concedi poterunt, præfertim afflietis, & ventriculi fervidioris ægrotantibus. Damnantur fru-Aus duriores, & ficci, ut fugaces , & horarit; fi cerafa acida, aut Ribium corymbos' excipias: Nam acida omnia valde expetuntur, quoniam' appetitum excitant , & magis reliftunt putredini . Inter Pomagaudent Hispani Camuliis cordiali , & inavissimo ac recreanti fructu, que cum. Italorum Appiii, & Germanorum Barftorfianis recte comparari possunt ; ista libere concedatis; Cydonia mala, & Punica acido dulcia, Limonum acidorum, ac Citriorum omne genus: Horum, & Aurantii fucco adversus venenatos, & malignos morbos vios fuifle antiquiores certum eft, ac proinde cæteris fructibus præferendi.

V.,

Hinc Saccharo condita, acidum Citri sorbetum Constantinopolitanum, gelatina: Cerasorum acidorum, Ribium, Berberum, Fragorum, & Prunorum, que Veronenses vocant Verdacchi, flores Borraginis, Curcita, C 6 curbita.

DE FEB. MALIG.

embita, Lactucarum caules, & denium raddices scorzonera, que fingulari proprietate puncticularis febris malignisati adversantur, impunè conceduntur.

VI.

Carnibus temperatis, & cum moderatione exhibitis ab initio alatur æger, pulla gallinacei, vel capi juvenes , aviculæ, 86 alaudæ, ac turdi præferuntur inter aves s Inter quadrupedes vitulina, præfertim in Italia sut in Hifpania & Gallia vervecina. que fuccis acidis, ad appetitum comparandum porerunt intingi, ex quibus, & fucci restaurantes & contusa seu Pista, Avicennæ olim inventum, & nunc maliercularum ambitio, prò imbecillibus ægrotis, quando præfertim urgent inappetentia, aptè parantur . Nec funt prætermittendaex. presla ex assatis carnibus, que validiora multoreddentur , fi inter affandum , aus elixandum infpergantur, aut imbibantur aquis cordialibus temperatis , & mixtis pulveribus pariter cardiacis : Nec defunt. qui vino generoso Ambra, & Moscho irforent, deinde cum iufculis, & ovis recentibus forbenda agrotis pro prandio exbibeantur.

VIL

Frateres erit praftantifimum, infoulis immifeere fuccum hordes, qui , fi , ut decet, extrahatur, antiquorum ptifanam fuperat, perat, & recentiorum experientia omnes implet in hac febre cibandi intentiones « Emuliones pariter feminum frigidorum; majorum in aquis cordialibus, aut iplis jufeulis, pro forbitionibus finul nutrientibus & refrigerantibus, funt valde ex ufu; non fic aunygdalata, quia caput tentant, & difficilius coquuatur, & nifi, cum fomri inducendi fese offert necessitas, cum emulsone fem. Papaveris, & aquis appropriatis veniunt usurpanda.

VIII.

Potus sit aqua decoctionis hotdei, & radicis Scorzoners, Buglossi, aut Oxalidis, que aliquid succiacidi Limonis, aut Citrà recipiat. Sic enim Pareus potionem suam divinam in febribus malignis, & pestilentibus oportunam praparat. Accipit

Aque decett. rad. Scorzonera (vel alterius radicis cardiaca temperata I cyathos VI.

Saccharifini uncias IV.

Sucei Limonum, vel Citri unc. I. Misceantur optime, & sæpè permutentur

de uno vase in aliud; deinde parum coquantur, addita portiuncula corticis Ci-

tri , & coletur pro usu .

Aliquibus valde arridet, & pariter convenit tinctura Rosanm, fi cum guttulis, fipiritus Chalcanti in aguis fiillatitiis Scorzonetæ: Oxalidis, Buglosse & similibus, extrahatur; Nec aqua stillatitia hordes est contemnenda, in qua sepius siustulums auri extinguatur: Destillatum, pariter excarnibus vitelina, aut pullorum, si ab empyrenmate Alembici, se nauseabundo quodam sapore vindicetur, non displicet.

IX.

Potus tamen non praebeatur nive refrié geretus sur moris est apud plérosque; vanlet nix mirum im modum ad pracautionem, ad curationem vero suité in valdé assurés; & valdé assuribus, parum prodes, quoniam calos innatus in hac febremaxime patitur.

X.,

Aliaque ad victus rationem pertinent inter morbi fymptomata hic potius recenfentur, exceptis quibusdam , aere, de quo religiose advertendum, ne intemperatus fit , aut conclave ventis , pervium, fed potius ad calidum vergens, in hac præfertim civitate & multis aliis fub-fimili aeris fubtilioris temperie constitutis, in quibus maximè feruandus ager eft , ne fe frigidiori. ambienti exponat, ne stragula reiiciat, ne in mutatione linteorum patiatuc. Quare fifieri possit,ne vel minimum furgat à lecto, præfertim die haufti medicamenti, aut in enematum reiectionibus, quandoquidem præter aeris incommoda, motus etiam & agitationiedamna perfentire cogitur . . .

Somous mox à cibo gravis est: trahitur enim per somoum ad interna viscera malignitas; incipiente, aut crescente accestione molessus, veneno nimium prævalente perniciosos.

XII.

Solentur fepius agros adfrantes, & spe salutis alant, & verbis alacribus, & vultu hilari recreent; nam vultum, & gestus medicorum maximė præ timore observant & groti; Prudenter tamen in hoc cunsta pronunciate, & inter spem admoneantur statim de periculo, & morbi gravitate, ut cum tempore animæ, & rebus domesticis consulant, antequant symptomatum seuitia mentem præpeditat. Quanto enim citius admonentur, eo minorem, periculi suspicionem concipiunt, eo minus timent: Nec imprudentia foret, etiam ante pulsus contastum, aut urinæ aspectum hoc munere sungi.

XIII.

Tempus cibandi varium est: in regulari curatione, a principiis, & vigore accessionum est abstinendum, in cura coasta, quandoque ingruente paroxysmo, a liquid porrigeadum, præfertim picrocholis, & quibus anxietas & cardialgia facilé suboritur. Declinante caloris fervore, cibus & potus. conserunt; Sed si in medio accessionis

vigore succedat animi deliquium, aut imgens exolutio, aliquid exhibendum; aut jusculum, aut offa vino cerasorum acidorum, aut Granatorum imbibita, quin & aliquando casus adeò urget, ut vinum oligophoron concedere cogamur, sed hoc magna cum præmeditatione facite, nami sæpé fallit hec assectio sub specie imbeeillitatis.

XIV.

Si propter longiores accessiones à tempore prandii ad cœnam nimia sit horaruns intescapedo, emulsionem, aut ovum jufculo conquassatum, aut sine ovo jus ipsuma circa vesperam exhibete, cœnam postmodum, quæ utplurimum excasnis sit, inaliam nostem protracturi; hoc tamen secundum horas accessionis mensuretur-

CHIRVRGIA.

SECTIO VI.

Chirurgia operationes in hac febre percuryuntar, vena fedio, cucumbitula tum ficca, tum farificata, hirudines, vefacantia fridiones, inunctiones, enemata, efithemata.

1

IN pulicari igitur febre detrahendus statim sanguis est, per venam sectam, maxime, xime, quantum fieri possit, ab initio: Est enim hac operatio tanti momenti, vet illa neglecta, vix saustum eventum in hac sebre vobis liceat sperate, quantum cunque blateret indoctum vulgus, cuius perniciosa petulantia licentiam in hoc sibi arripit; peritiorum etiam medicorum operationem arguendi ac coercendi. Non vos ista deterreant, & à recto medendi tramite, latum unguem avertant: Extrahite in., principio alacriter saguinem, pro plenitudinis & virium ratione, summatim verò ad quartum usque; quinimò etiam & illo toto tempore, quo non admodum diffusa fuerint contagionis seminaria: Com plesthora autem etiam post dispersionem.

II.

Mittite ex utroque brachio, ut proxidemm ventrem evacuesis: In suppressis autem mensibus, aut hamorrhoidibus, ex talo: sic enim à corde longius retraheture virulentia, sic exonerata natura ab ea, qua antea sarcina premebatur reliquum validius superabit, & patentius ac copiosius reservata obstructione, puncticulas foras detrudet, cum magno ægrotantis leuamine, propter ventilatum calorem, obstructionem reseratam, & coercitam putredinem.

III.

Sanguinis millionem ex venis sub lingua mitum

mirum in modum proficere in hac febre observatum est: Hac enim evacuatione pauci diffipantur fpiritus, & fimul ex vena caua, etfi non largius, propins tamen, & celerius educitur fanguis, quam ex venis brachiorum , bafilica aut communi .

1 V .-

Verum quia ha jugularis externa fund productiones, que superclavia, ac deinde cavæ ascendentis est ramus , nil prohibet multum exhaustæ , quò minus de maiori fanguinis fonte elicere, haurireque police mo debeant ...

Quin multum etiam hac fola ration malum levare poterit harum venarum fe-Rio, quandoquidem ambæ fimul aperta. (ut fieri solet) fingulari æquilibrio ab utroque latere fundunt fanguinem ; Quo emolumento non gaudet unica brachii phlebotomia, in locis potissimum, in quibus parce admodum, & cum meta extrahitur fanguis, uti fit Verona, cujus cœli temperies non permittit liberalius venas fecare ; fecus in Gailia & Hispania, ubi adeò expetitut in extrahendo fanguine aquilibrium , ut vix ab uno brachto dematur, quin protinurab altero pari-hauriater preportione.

PETR. A CAST. 37

Si tamen morbi principium cum ingenti plenitudine nacti fucritis, prius è brachio educite fanguinem; deinde ad tundendas fub lingua taninas accedite.

VII.

Si vero cum magna plethora plus malignitatis quam putredinis figna appareant, tutius erit prius malleolum tundere, intactis brachiis, ut diminuta plenitudiue, fimul à corde longius revellatur; mox ad venarum fub lingua fectionem, ut dictum est, properate.

VIII.

Hanc faphænæ in febribus pestilentibus fundende doctrinam, magnorum virorum autoritate stabilitam , felicislime ad usum renocauit. D. Valentinus Medicus Venet. constitutione epidemica anno 1629.urbem depopulante, in qua, ut fiers folet, maligni fucciad caput, & partes principes raptu ferebantur, acutas phrenitides; & horrenda deliria excitantes. Hoc auxilio infiniti postmodum evaserunt, cum summaartificis gloria : eualit & ipfe Galentis fuo tempore 4 febre pestilenti per Asiam immaniter graffante, fanguine ad binas libras è cruribus extracto; ut ex Oribafio refert apud Galenum Autor præfagij experientia confirmati &

DE FEB. MALIG.

IX.

Cæterum Ægyptij usque adeò raninarum phlebotomia considuntaut pro arcano habeat eadem uti ad inflammationes quaslibet capittis, atque oculorum assectus, ruborem saciei, sebrilem phrenitidem, vigilias, sebres acutas, dum die critico natura crissim per hemorrhagiam remoratur; tertianis quoq; sebribus levaméto esse lacobus de Partibus testissicatus est. Videte Severinum, Chirurgiæ essicais part. 2. de angiologiacap. 14.

X.

Nec ideo apparentes puncticule ablos lutus fit vobis phiebotomia terminus: Manente enim plethora, etiamf infinitæ propemodum erumpant maculas, non protinus a fanguinis missone erit abstinendum, nullus tunc regrediendi adest timor, nec vacuus supered locus, in quem succi. Subeano

XI.

Sed pro ista doctrina valde ardua ; & dissicili, operam & studium impendite, ut exquiste plenitudinis signa inseparabilia vobis innotesseant, than illius, que secundum vires est, than illius, que ad vasa dicitur: Huius certa signa sunt tenso, rubor, obstructio, su alterius inseparabilis gravitas. Legite Gal. lib.de Plenitudine.

PETR. A CAST.

69

Si hæc appareant, sanguinem mittite. nullis tamen alijs, præter cutis efflorescentiam , que maioris fint momenti , repugnantibus; si verò nulla fint plenitudinis figna, cauete in hac febre cane pejus & angue à venæ fectione, post puncticularum præfertim exitum: In irreparabilia etenim pericula ægrum deducetis, revocatis ad interna corporis infectis humoribus, permixtis altius feminariis , putredine aucta, & tandem viribus ad internecionem exfolutis. Audite, ut Avicenna in variolis hanc doctrinam vobis ingerat : Cum variola (inquit) lib.4.Fæn.I.traft.4. c.10. egrediuntur, non oportet tunc ut administretur phlebotomia, nik inneniatur repletios ant deminium materierum .

XIII.

Nec tamen semper sola plenitudinis præsentia debet elle inviolabilis norma ad tundendam venam in hac sebre. Multa enim occurrunt, que islam operationem impedire valeant: Alia, que illam, si non omninò tollant, saltem minuant & coardent. Illud facient symptomata prava & gravissima, que in principiis solent quandoque præ malignitate apparere, sacientia colliquationes, syncopes, exsolutiones, anxietates, & alia, que aureo illo capite 14, lib.t. de arte curativa ad Glaucon. susè

DE FEB. MALIG.

IX.

Cæterum Ægyptij usque adeò raninarum phlebotomia confidunt, ut pro arcano habeat cadem uti ad inflammationes quaslibet capitis, atque oculorum afectus, rusborem faciei, febrilem phrenitidem, vigilias, febres acutas, dum die critico natura erism per hemorrhagiam remoratur; tettianis quoqis eribius levaméto esse lacobus de Partibus testificatus est. Videte Severinum, Chirurgiæ essicatis part. 2, de angiologiacap. 14.

Nec ideo apparentes puncticule abloslutus fit vobis phiebotomia terminus: Mamente enim plethora, etlamfi infinita propemodum erimpant maeulas, non protinusa fanguinis millione erit abfinendum, nullus tunc regrediendi adeft timor, nec vacuus superedi locus, in quem succi subcanto-

XI.

sed pro ista doctrina valde ardua; & disticili, operam & studium impendite, ut exquiste plenitudinis signa inseparabilia vobis innotesscant, thm islius, que accundum vires est, thm islius, que ad vasa dicieri: Huius certa signa sunt tenso, rubor, obstructio; ut alterius inseparabilis gravitas. Legite Gal. lib.de Plenitudine.

PETR. A CAST.

Si hac appareant, languinem mittite. nullis tamen alijs,præter cutis efflorescenciam , que maioris fint momenti , repugnantibus; si verò nulla sint plenitudinis figna, cauete in hac febre cane pejus & angue à venæ fectione, post puncticularum præfertim exitum: In irreparabilia etenim pericula ægrum deducetis, revocatis ad interna corporis infectis humoribus, permixtis altius feminariis , putredine aucta, & tandem viribus ad internecionem exfolutis. Audite, ut Avicenna in variolis hanc doctrinam vobis ingerat : Cum variola (inquit) lib.4.Fæn.I.traft.4. c.10. egrediuntur, non oportet tunc ut administretur phlebotomia, nife inveniatur repletio, aut dominium materierum.

XIII.

Nec tamen semper sola plenitudinis presentia debet esse inviolabilis norma ad gundendam venam in hac sebre. Multa ensim occurrunt, que islam operationem impedire valeant; Alia, que illam, si non omninò tollant, saltem minuant & coardent. Illud facient symptomata prava & gravissima, que in principiis solent quandoque pre malignitate apparere, sacientia colliquationes, syncopes, exsolutiones, anxietates, & alia, que aureo illo capite 14, lib.t. de arte curativa ad Glaucon. susè

vos docebit Galenus. Hoc verò, iusta. libratio virium agrotantis, multitudinis plethore, accessionis, consuetudinis, atatis, habitus corporis, causte alicinis procatarica violenta, & aeris ambientis; circa quem alta mente reponite auream Hippocratis sententiam, lib.4 de ratione victus, t. 19. Cum sueria aer abunde calidus; to secun sia un citò ab eo corpus evaporet; mempe tum à sanguinis missione abstinemus, etiams morbus magnus si, vigenque etane homo; licet non semper actate media grassari soleathic morbus, sed sepe atrocius irruat hyeme, ut unua experimur,

XIV.

. Cucurbitula.

Si quod aliud auxilium, in hoc morbo funt efficacissime. Post unam igitur, aut alteram per venam scham evacuationem, (si bona agrotantis sorte ad principium morbi suceritis accersiti,) affigite cucurbitulas scariscatas imo dorso; sin minus, & tardins vocatis principij occasio iam non suppetat, statim post vias ductuum vel leniente, vel clystere saltem expiatas; exque per morbi decursum eruntrepetende, quoties opus suerit, vel ratione revulsionis, vel evacuationis.

Audite, quid Celsus de cucurbitulis sentiat: Quando quidem, ait, ut ex eis minus wehemens est auxilium, se cerre en magis. magis tutum nec unquam oft periculofum; etiamfi adhibeantur. Ideoque ubi sanguinem mittere opus est, & periculum à vena seda imminet, huc potius consugiendum.

XY.

Suris, & malleolis affixæ cum decentifeatificatione, apprime venæ sectionis viccem subeunt, dicente Galeno 2. Aphoris.

17. Aquabilis omnium humerum vacuatio, qua exactissima habetur, sectione ven na administrari solet: Qua proxime ad hanc accedit, seatificatis, ut facere confuevimus, sit malleolis Quod auxilium apud Hispanos pro curatione morborum, qui infantes insestant, est usitati simum, & se felici experimento etiam Veronæ confirmatum.

XVI.

Scarificatio in his febribus sit mediocris; quam magis amplectebatur Galenus 2. ad Glauc. cap. 7. Solet namq; ob ingentem malignitatem quandogi'adeò dissolvi retentrix facultas, ut vix possit vel ipsoigne cohiberi fanguis; quod in prognosi sit vobis inter signa pessima. Observavit in Peste Zacutus lib. 3. prax. admir. observ. 42. Per mediocrem igitur scarificationem minus periculi imminet: Robusti tamen, & agrestes homines,' nisi; conspiciatur ingens retentricis laxitas, scissura levis ac su-

perficialis sufficit . In cunctis tamen hoc periculum præcavete in hac maligna febre: ab una scarificata cucurbitula reliquas dirigite , fi prima laxitatem oftendat , alias levius fcarificate .

XVII.

Natibus affixæ miram operam in revellendo prastant, quin & evacuando : quandoquidem, tanta est natium cum toto affinitas, ut in illis speciatim scarificatio fa-Ca sit vicaria phlebotomiæ: Vt notavit ex Avicenna l.1. Fen 4. cap. 21. Eruditifimus Rhodiginus, lect. Antiqu. lib. 4. c. 8.

XVIII.

Inguinibus, ac fub alis applicate virulentiam a corde mire extrahunt, quo auxilio in febribus laboriofis, que non cedunt aliis remediis, ad partes ignobiles maleficus fuceus convocatur, ad quas natura fæpe illum detrudere fatagit , cum_s utilitate mira.

"XIX.

In diversis præterea partibus folet scarificari , pro tymptomatum varietate . Pro derivatione in pertinaci fincipitis dolore, aut graviori capitis affectu, summa cum utilitate vertebris colli affiguntur : Sic in febre fingultuofa, regioni stomachi affixæ, & altius scarificate, pertinacissimum symptoma frenant; quod nuper observastis in Monacho Franciscano, a continuo, ac maligno singultu hoc auxilio liberato. Non desucurbitis, qui plantis pedum applicarent; Sic enim è medio corpore fervidum calorem attrahi, venenatos spiritus evocari, pessissimo adque apostemata transferri posse, magno nature solatio existimabant, ut aunotavit, & comprobavit Doctiss. Seuerinus, Pyrotech. Chirurg. lib.2. part. 2.

XX.

Vtero gerentibus hac febre correptis, quibus non ita tutum est venam scindere, affiguntur cucurbitulæbrachiis, fupra musculum Deltoidem, facta mediocri scarificatione: Quod tamen nisi in urgentissimo capitis, vel faucium affectu, nolite tentare pleno corpore, & nisi aliquid magnum impediat : mittite priùs fanguinem à vena communi, aut Cephalica, nunquam à Bafilica, quæ facilè abortum excitat: Deinde urgente necessitate, ad brachiorum & dorfi, fupra Omoplatas, fearificationem accedite. Si tamen non licet venam tundere, & fueritis coacti, ad fcarificationem flarim devenite, pracedat faltem leniens ac detergens medicamentum, quod faburram deorfum trudat , ne prompta fit materia... cruda, quæ per superiores cucurbitulas surfum noxiè deferebatur venas fubita .

450

vigore succedat animi deliquium, aut imgens exolutio, aliquid exhibendum, aut jusculum, aut offa vino cerasorum acidorum, aut Granatorum imbibita, quin & aliquando casus adeò urget, ut vinum oligophoron concedere cogamur, sed hoc magna cum premeditatione facite, nam sepè fallit hec affectio sub specie imbecillitatis.

XIV.

Si propter longiores accelliones à tempore prandii ad cœnam nimia fit horaruns intescapedo, emulsionem, aut ovum jufculo conquastatum, aut sine ovo jus ipsum circa vesperam exhibete, cœnam postumdum, quæ utplurimum excamis sit, in_s aliam nostem protracturi; hoc tamen secundum horas accessionis mensuetur.

CHIRVRGIA.

SECTIO VI.

Chirurgia operaciones in hac febre percuryuncar, vena fedio, cucunditula tum fica, tum farificata, hirudines, veficantia fridiones, inundiones senemata, efithemata.

1

IN pulicari igitur febre detrahendus flatim fanguis est, per venam fectam, mazimė, Rime , quantum fieri poffit, ab initio : Eft enim hæc operatio tanti momenti , ve illa neglecta, vix faustum eventum in hac febre vobis liceat sperate, quantumeunque blateret indoctum vulgus, cuius perniciofa petulantia licentiam in hoc fibi arripit; peritiorum etiam medicorum operationem arguendi ac coercendi . Non vos ista deterreant , & à recto medendi tramite. latum unguem avertant : Extrahite in. principio alacriter fanguinem, pro plenitudinis & virium ratione, fummatim verò ad quartum usque ; quinimò etiam & illo toto tempore, quo non admodum diffusa fuerint contagionis seminaria : Cum plethora autem etiam post dispersionem .

n

m

-0 م موک

18 A

15 ft20

nèp

II.

Mittite ex utroque brachio, ut proxid mum ventrem evacuetis: In suppressi autem mensibus, aut hamorrhotdibus, ex talo: sic enim à corde longius retraheture virulentia, sic exonerata natura ab ea, qua antea sarcina premebatur reliquum validius superabit, & patentius ac copiosius referata obstructione, punsticulas foras detrudet, cum magno ægrotantis leuamine, propter ventilatum calorem, obstructionem referatam, & coercitam putredinem.

III.

Sanguinis millionem ex venis fub lingua mitum mirum in modum proficere in hac febreobservatum est: Hac enim evacuationepauci dissipantur spiritus, & simul ex venacaua, esti non largius, propius tamen, ecelerius educitur fanguis, quam ex venisbrachtorum, basilica aut communi.

I V ..

Verum quia hæ jugularis externæ fund productiones, quæ superclaviæ, ac deindecavæ ascendentis est ramus, nil prohibet multum exhaustæ; quò minus de maiorisanguinis sonte elicere, haurireque postermo debeant.

٧.

Quin multum etiam hac fola ration in alum levare poterit harum venarum fetio, quandoquidem amba fimul apertario, quandoquidem amba fimul apertario, quandoquidem amba fimul apertario, qui latere fundunt fanguinem i Quo emolumento non gaudet unica brachii phlebotomia, in locis potifimam, in quibus parce admodum, & cum metu extrahitur fanguis, uti fit Verona, cujus celi temperies non permittir liberalius venas fecare; fecus in Gailia & Hifpania, ubi adee expetitur in extrahendo fanguine aquilibrium, ut vix ab uno brachio dematura quin protinusab altero pari-hauriatur proportione.

Si tamen morbi principium cum ingenti plenitudine nacti fucritis; prius è brachio educite fanguinem; deinde ad tundendas fub lingua raninas accedite.

VII.

Si vero cum magna plethora plus malignitatis, quam putredinis figna appareant, tutius efit prius malleolum tundere, intactis brachiis, ut diminuta plenitudiue, fimul à corde longius revellatur; mox ad venarum fub lingua fectionem, ut dictum est, properate.

Hanc saphænæ in febribus pestilentibus tundende doctrinam, magnorum virorum autoritate stabilitam, felicissime ad usum renocauit. D. Valentinus Medicus Venet. constitutione epidemica anno 1629.urbem depopulante, in qua, ut fiers folet, maligni succiad caput, & partes principes raptu ferebantur, acutas phrenitides ; & horrenda deliria excitantes. Hoc auxilio infiniti pollmodum evaferunt , cum fumma. artificis gloria : eualit & ipfe Galentis fuo tempore 4 febre pestilenti per Asiam immaniter graffante, finguine ad binas libras è cruribus extracto; ut ex Oribalio refert apud Galenum Autor præfagij experientia confirmati «

Cæ-

Si

de

hei

-

nu.

ı fe

rtxi

ntro.

emo-

phle.

puibus

hite

i tem-

135 fe-

i ades

equili-

matur,

er pre

DE FEB. MALIG.

IX.

Cæterum Ægyptij usque adeò raninarum phlebotomis confiduntsut pro arcano habeat cadem uti ad inflammationes quaslibet capitis, atque oculorum affectus, rusborem faciei, febrilem phrenitidem, vigilias, febres acutas, dum die critico natura critim per hemorrhagiam remoratur; tertianis quoq; febribus levaméto effe lacobus de Partibus teltificatus eff. Videte Severinum, Chirurgiæ efficacis part. 2, de angiologiacap. 14.

Nec ideo apparentes puncticule abloslutus sit vobis phiebotomia terminus: Manente enim plethora, etiams infinita propemodum erumpant maeulas, non protinusa sanguinis missone erit abstinendum, nullus tune regrediendi adest timor, nec vacuus supered locus, in quem succi subeano

XI.

Sed pro ista doctrina valde ardua ; & dissicili , operam & studium impendite , ut exquiste plenitudinis signa inseparabilia vobis innotesseant , thm illius, que ad vasa dicitur: Huius certa signa sunt tensio, rubor , obstructio ; ut alterius inseparabilis gravitas. Legite Gal. lib.de Plenitudine.

PETR. A CAST. X I I.

Si hae appareant, sanguinem mittite, mullis tamen alijs,præter cutis efflorescenciam , quæ maioris fint momenti , repugnantibus; si verò nulla fint plenitudinis figna, cauete in hac febre cane pejus & angue à venæ fectione, post puncticularum præsertim exitum: In irreparabilia etenim pericula agrum deducetis, revocatis ad interna corporis infectis humoribus, permixtis altius seminariis, putredine aucta, & tandem viribus ad internecionem exfolutis. Audite, ut Avicenna in variolis hanc doctrinam vobis ingerat : Cum variola (inquit) lib.4.Fan.1.traft.4. c.10. egrediwatur , non oportet tunc ut administretur Phlebotomia, nif inveniatur repletio, aut dominium materierum.

XIII.

Nec tamen semper fola plenitudinis prælentia debet elle inviolabilis norma ad tundendam venam in hac febre . Multa enim occurrunt, que istam operationem impedire valeant: Alia, que illam, fi non omnine tollant , faltem minuant & coar-Stent . Illud facient symptomata prava & gravissima, que in principiis solent quandoque præ malignitate apparere, facientia colliquationes, syncopes, exfolutiones, anxietates, & alia, que aureo illo capite 14. lib.t. de arte curativa ad Glaucon. fusè

tudine, Si !

anias

CC29

qua

, f#

, VIEL

natori

; ter

cobs

e v eri-

angio-

able

us:Ma

tæ pro

rotivi

nect

ubean

ua , 8

ndite,

parabi

que fe

ad vali

nfio, r

vos docebit Galenus. Hoc verò, instalibratio virium agrotantis, multitudinis plethora, accessionis, consuetudinis, arbitus corporis, causa alicuius procatarctica violenta, & aeris ambientis; circa quem alta mente reponite auream Hippocratis sententiam, lib.4.de ratione victus, t. 19. Cum suerit aer abunde calidus, & secunda calidus, & secunda calidus, & secunda canada calidus, & secunda se un assentantis missione abstinemus, etiams morbus magnus set, vigensque atate homo; licet non semper assentationed agrafiari soleat hic morbus, sed sepe aerocius irtuat hyeme, ut nunc experimur,

XIV.

. Cucurbitula.

Si quod aliud auxilium, in hoc morbo sunt efficacissime. Post unam igitur, aux alteram per venam sectam evacuationem, (si bona ægrotantis sorte ad principium morbi suritis accersiti,) affigite cucurbitulas scarissicatas imo dorso; sin minus, & tarduls vocatis principii occasio iam non suppetat, statim post vias ductuum vel leniente, vel clystere saltem expiatas; eæque per morbi decursum eruntrepetend equoties opus suritis, vel ratione revulsionis, vel evacuationis.

Audite, quid Celsus de cucurbitulis sentiat: Quando quidem, ait, utex eis minus vehemens est auxilium, se certe est magis magis tutum, nec unquam est periculofum; etiams adhibeantur. Ideoque ubi sanguinem mittere opusest; & periculum à vena sed a imminet; huc potius consugiendum.

inis

atis,

irca

eus dus

ret :

enf-

Mate

Lepe

nur.

orbo

, aut

nem i

urbi-

ùs,&

n non

e æque

quo-

ionis

is fen-

is mis

ree est

agis.

XV.

Suris, & malleolis affixæ cum decenti fearificatione, apprime venæ sectionis vicem subeunt, dicente Galeno 2. Aphoris.

17. Aquabilis omnium humerum vacuatio, qua exactissima habetur, sectione vena administrari solet: Qua proxime adhanc accedit, scarificatis, ut facere consuevimus site malleolis. Quod auxilium apud Hispanos pro curatione morborum, qui infantes insestant, est utitatissimum. & selici experimento etiam Veronæ confirmatum.

XVI.

Scarificatio in his febribus sit mediocris, quam magis amplectebatur Galenus 2. ad Glauc. cap. 7. Solet namq; ob ingentem malignitatem quandoq; adeò dissolvi retentrix facultas, ut vix possit vel ipfoigne cohiberi fanguis, quod in prognos sit vobis inter signa pessima. Observavitin Peste Zacutus lib. 3. prax. admir. observ. 42. Per mediocrem sigitur scarificationem minus periculi imminet: Robusti tamen, & agrestes homines, nissi, conspictatur ingens retentricis laxitas, scissiradigent satis profunda, pueris contra levis ac super-

•

10 500

perficialis sufficit. In cunctis tamen hoc per iculum præcavete in hac maligna sebre; ab una scarificata cucurbitula reliquas disigite, si prima laxitatem ostendat, alias levius scarificate.

XVII.

Natibus affixæ miram operam in revellendo præstant 3 quin & evacuando: quandoquidem, tanta est natium cum toto assinitas, ut in illis speciatim scarificatio sacha sit vicaria phlebotomiæ: Vt notavie ex Avicenna 1.1. Fen 4. cap. 21. Erudicissimus Rhodiginus, lect. Antiqu. lib. 4. c. 8.

XVIII.

Inguinibus, ac fab alis applicate virulentiam a corde mirè extrahunt, quo auxilio in febribus laboriofis, que non cedunt aliis remediis, ad partes ignobiles maleficus fuccus convocatur, ad quas natura fape illum detrudere fatagit, cum., utilitate mira.

"XIX.

In diversis præterea partibus solet scarificari, pro symptomatum varietate. Pro derivatione in pertinaci sincipitis dolore, aut graviori capitis affectu, summa cum utilitate vertebris colli affiguntur: Sic in sebte singultuosa, regioni stomachi affixe, tamen hor igna febre eliquas di dat, alian

in revel

o: quine

toto affi

icatio fa

tavites

tiffimu

e viru

quo au

non ce-

nobilet

uas na-

, cum.

t fear

e . Pro

dolores

na cum

: Sic in

& altius scarificate, pertinacissimum symptoma frenant; quod nuper observastis in Monacho Franciscano, a continuo, ac maligno fingultu hoc auxilio liberato. Non defuerunt etiam , inquit Anonymus lib.de cucurbitlis, qui plantis pedum applicarent ; Sic enim è medio corpore fervidum calorem attrahi, venenatos spiritus evocari, pestifera denique apostemata transferri poste, magno nature folatio existimabant, ut annotavit, & comprobavit Doctifs. Seuerinus, Pyrotech. Chirurg. lib.z. part. 2.

XX.

Vtero gerentibus hac febre correptis, quibus non ita tutum est venam scindere, affiguntur cucurbitulæ brachiis , fupra musculum Deltoidem, facta mediocri scarificatione: Quod tamen nisi in urgentissimo capitis, vel taucium affectu, nolite tentare pleno corpore, & nisi aliquid magnum impediat : mittite priùs fanguinem à vena communi, aut Cephalica, nunquam à Bafilica, quæ facilè abortum excitat: Deinde urgente necessitate, ad brachiorum & dorfi, fupra Omoplatas, fearificationem accedite. Si tamen non licet venam tundere, & fueritis coacti, ad fearificationem flatim devenite, pracedat faltem leniens ac detergens medicamentum, quod faburram deorfum trudat , ne promptafit materia. cruda, que per superiores cucurbitulas surfum noxiè deferebatur venas fubita .

nh (2)

CK-

affix 2; 8

74 DE FEB. MALIG.

Cucurbitula Sicce .

Post primus evacuationes, semper optimes. Nam in bac prasertim puncticulari sebre à centro ad circumserentiam corporis insectos succos, & deleterios halitus evacuandi gratia nullum prassantius auxilium, non solum lumbis & seapulis, sed sterio, & costis, tam dextris quam sinissiris, non solum semel in die, quod saltemste fiat moneo, sed bis, & ter, & quod saltemste fiat moneo, sed bis, & ter, & quod series expedite videatur, multiplici repetitione affixe, & pro varietate accidentium, huic febri supervenientium, variis pariter in locis, & sec., & scarificate solent-upplicari; Puts, eccipiti, summis brachijs, and veneris, aut hypochondriis, secundum symptomatum occurrentium diversitatem, revulsionem sepe, quandoque derivationem, evacuationem ad externa semper procutando.

XXII.

Pro tevultone à capite, ut fapius opuseff, incipiat Chirurgus cucurbitulas affigere, ab infernis partibus fentim procedendo ad fupernas. In his, circa capite nempe, apponar humiliores; se que fuerint amplioris orificii, minus namq; iftutrahunt; in imis verò partibus affigantur clariores, et que angusum os habeant: filis namque competens, ait Oribasius apad. Galenum, in quibus scarificacione quidem, non utimur, sed per levium cucurbitularum applicationem vehementer attrahere volumus, Orib, de eucur, cap. 16,

XXIII.

211

itus

xi-

tem:

ties

one

nic

ter

8P-

js ,

UM

eme

tio-

per

affi-

oce.

tue.

neur

Mis

Præterea cum mediocri flamma affigantur, & fi a centro validius fuerit opus attrahere, etiam cum multa fatis longo fpatio teneantur affixe, nili fcarificande fuerint. In his enim breyi auferantur ne denfatus fanguis exitum per vulnera impediat. Eliminetur Italorum abufus, cucurbitulas in labrum aque calentis imponendi ; sic dum curiofius tractare ægrotante cupiunt, copiosa aqua affulione magnopere ladunt, cò magis, fi ambiens ger fuerit fubfrigidus, Aptaest pro hypocaustis consuetudo pro fanis corporibus abluendis : at agrotantibus nimis importuna. Ma etfi leviora videantur, non tamen in praxi funt contemnenda, & hoc ordine femper à cucurbitylis Gcois utilitatem reportabitis.

XXIV.

Frictiones .

Eademrationes sient non dura, aut valde frequentes, ne ob assiduitatem aut duritiem cutim donsent, & febrem augeant. Neque nimis molles, ne propter multitudinem succorum digestio, prohibeatur;

mediocres fiant, que vel ob id mirabiliter puncticulari febri opitulantur, quod protractis, & feminariis, & in halitum digeflis, experimento videamus protinus ab angore agros quiescere : præfertim fi fiant circa pectus & dorfum, mirè namque fuccos pravos a corde evocant. In cruribus, & suris deorsum factæ optime a nobilioribus partibus revellent, & totum corpus evacuant. Quapropter ab his , nt & à cucurbitulis ficcis defistendum non et, donec veneni vis , & accidentia quodammodo mitescere videantur: Moliri autem huiusmodi frictiones oportet linteis afperis , vel etiam levitet inunctis manibus cum oleo . Amygdalarum amaratum, fiantque femper ante prandium, vel ante cœnam.

and the latter X X V.

Inunctiones -

Eandem intentionem, etsi non ita efficaciter, adimplere posiunt, præstantius tamen entim disponunt, ut per cucurbitulas, aut frictiones posimodum evaporatio succedat: quin & referatis poris excitatur sudor sepe in hac sebre admodum expetitus. Fiunt vel ex simplici Amygdalino dulei, velusitato, aut Chasaclino, si sortitis evocandi urgeat occasio, oleo, aqua, & modico Nitri, quam Aetii inunctionem vocant, que se aprè parabitus. Rec. Olei Amygdali. Avar. une. 2. Agua une. 1.

iat

Piat decoctio ad confumptionem aque , mon adde Nitri Drachm. r. Pro linimento.

XXVF.

Vngi folet præterea corpus, & foveris decoctis chalafticis plerifque, aut oleis calidis ut eft oleum Scorp. Matthioli, oleum Citri & alia , que caute tamen adhibeantur corpore feilicet fatis evacuato, in febris remiffione , aut mane ante exacerbationem, corpore aut tempore non valde æstuantibus. Ideò hac profunt præcipue fæminis, & corporibus magis pituitofis , nec multum calidis. Irem in frigidis temporib.in quibus rationi confonum est , cutem quodammodo esse densiorem, & humores crassiores: Chalastica sunt decosta Chamæmeli, Althew, Rorifmarini-Meliloti, Fenugræci & similium, quibus rarefa-Ra cutis, ad puncticularum & fudoris exisum recte disponitur.

XXVII.

Epithemata .

Exterius regioni cordis, aut aliis corporis partibus appolita, multi in febre pundiculari merito eliminant, prafertim fi fint frigida & emplafica, quia cutea, opplent, & evaporationem potius impedint; Attamen liquidioribus licet frigidis, fi ad penetrationem pauca calida, & tenuia ad-D 3 mimifceantur quotidie feliciter utimur : fi præfertim t p da apponantur . His non obstantibus, unquentum florum Arantiotum, quod Neapolitant, ab Hispanis vocant Manteca , nolite prætermittere : Eff enim admirande virtutis in corroborando corde, & halitibus tetris ac malignis. Huic foleo admiscere pulveres Diamarg, fr. & guttullas olei Scorp. Matthioli : itemque fucci Citri , Limonis, aut aceti Sambucini totidem. Liquida tamen Epithemata conficite ex aquis flor. Citri, Bugloffe, Rutæ caprarias Cardui benedicti, & cordiali Saxonia an. in quibus confectionem Hyacinthinam, species cordiales dissolvite, additis guttulis aceti Sambucini,& gutta una vel altera effentia Chrocisaut Citri .

XXVIII.

Ventriculus, hepar, & ipfa fummani cutam expetunt; Corroboretur hoc succo Cichor, additis speciebus trium Santalorum; aut Diarhodonis Abbatis. At ille; oleo Absinthite; & Nardino; quandoque Massichino, aut Menthe; cum sp. Aromatriculo respondens; ad spina vertebras intatale relinquatur; ea namque parte delimita efficacius souetur ventriculus; exidentiusque recreatur;

PETR. A CAST.

Vesicantia .

Sola Italia haber in frequenti usu in fefre puncticulari. Introduxit usum Hercules Saxonia Ptavanus, vir insgnis, non fine multa contradicentium altercatione, vicit tamen auxili præslantia, & rei ipsus experimentum ceruicosos superavir. In febribus pestilentibus & malignis, nihil præstantius; renellont namque acris medicamenta, artubus apposta success ad caput, visceraque avergentes, air Galen, lib. de equipit. 19.

XXX.

At circa huius infignis auxilij usum carete, ne in abusum perperam abeat; ne indiscriminatum, ac sine delectu cunctis prascribatis agrotantibus. Non semper solet prodeste, ut in hac epidemica constitutione observastis; imo multos absque vesicantibus persecte liberatos vidistis. Advertite diligenter, cuinam temperamento aut humori magis adhete at inconstantis sista sebris. Si sangineum aut biliocum temperamentum corripiatur sabstinete à vesicantibus; si printiosum, aut merancholicum, seur printiosum, aut merancholicum, seur printiosum, aut merancholicum, seur printiosum, seur merancholicum, seur

XXXI.

Signa horum temperamentorum recoli-

DE FEBR. MALIG.

te superius ex sect. 3. Illa, quia faciliorem motum a natura so tita sunt, & quia acriora faciliùs naturam ipsamirritant, persecta criss nisi i npediantur, levari solent; quod sepe saciunt vescantia : Ista vero, quia pigitora in motu, & minus acria, non ita facile à natura reguntur, qua segnius per istos humores ad crises accingitur: Quare vescantibus iuvari solet; qua per sensime factam evacuationem criss vicem apprime supplere valent.

XXXII.

In sanguineis igitur temperaturis erifes laudabiles expectato , nifi nimis excellens malignitas fanguinem corrumpens, robur virtutis omnino oppresserit. In biliosis, & ficcoribus, præter vigilias & ingentes dolores, quos veficantia inferunt , vel ulcera excitant dy fepulotica, & que facile cacoethiam induunt; vel nullo attracto peccante fucco, fapius vos fruftratur fpei. In melancholicis , & pituitofis , in quibus præ exteris conveniunt , hoc advertite,ne in_ eruribus tumores fint fcorbuti,aut cedematofi , qui in visceribus arguant cachexia rudimentum: Facile enim in necrofes immedicabiles delabetur æger;ut Nobili Comitiffe Seratice Veronensi nuper contigit.

XXXIII.

Senes primi fenii, & fucculentiores hoc remedium facilius ferunt, nullo pado ex fucci fucci, aut decrepiti: Pueri fatis foliciter. Isti, quia ingentes cruditates propter vo-factiatem congerunt, que hoc auxilio tanquam per pyrotica senum educuntur: Illigrobusti, expulticem tamen habent valde fractam, unicam crism perfectam molisi impotentem. Quapropter hac vesicantium epicrasi optime invari contigit.

XXXIV.

Tempus administrandiest principium morbi, non status, vel quando ægrotantes iam sunt extinctioni proximi. Nec timendum, quod à crision status itura avertatur natura; namque evacuatio salutem satura exspectaoda non est in pessioniti, se maligno affectu. Quamobrem securior est eamorbi solutio, que paulatim & sensim sit, quam que necesario pugnam requirit, en quan que vistrix evadit natura: Saturs tamen eritassigere post vnam aut alteram evacuationem; à primo lenienti medicamine scilicet, & sanguinis missione aliqua, quomodocunque stat.

XXXV.

Apponuntur frequentius brackiis supra earpum , ut tamen relinquatur locus medico tangendi pulsum , & cruribus supra malleolos, quatior digitis, parte dimeslica. Solent etiam coxis supragenta affigi, sed præsertim sominis, quin & aliis

patibus , pro accidentium varietate .

XXXVI.

Nec defunt, qui plantis pedun affixesint, non vesteantia folum, seu sinapitmos sed hoc importinum valde, nec mis ingentibus capitis affectibus celebrandum; ut in lethargo desperato, 86 hemotrhagia natium extrema ofus est Solertissimus Zacutus lib. 5. praxsiste nu.VII.

XXXVII.

Mitius funt auxilium epifpaflica malage mata plantis pedum applicata, quibus ab alto ad ignobiliora loca potenter retya-fundur peccantes fricci. Malignam febremi curavit in muliere Martinis,ex Riverij refatu, cataplafmate ex cochleis s cum fuit tellis contulis, liupifque fuperpolitis plantis pedum quinta morbi de applicato, quo poff dolores ingentes in cruribus , & fudores per univerfum corpus excitatos, adea fottida materia attraffa eft i adeo teter odor ex ablatis cataplafmatis exfpiravit, ut vix adffantes fullimere pollent . Remedium eft non contemnendum; quod ex diterfis peteritis etiam dum conficere; calidie tamen , & attrahentibus , ut Salvia , Sampfucho , Sinapr , & fimilibus , quin & & Theriaca , aut Mithridatio , oleoque Scot pionum mixtis

XXXVIII.

Nateria velicantium eli varia: Vtamini cerato .
cer-Canchar prape une femis e
Eughorbij ;
Sinapis ana drache unam;
Sem. Ammeos e drache femise
Gera e
Refina ;
Terebinehina, q. f.
co flat Ceratum f.2.

XXXIX.

Hirudines . ı melancholicis temperamentis opti-, fedalibus venis affixæ o dum parca uinis evacuatione opus eff-aut pro lati non suppetur tvires ; quovis morbi pore, in progreffir, pro revultione, à te præfertim : in principio , pro evaione, que quantumliber copiosa sucet , si cum oalneo vaporoso far, post stionem hirudinum; aut lumbis, aliquo inte symptomate . Sed in hoc adminiido auxilio advertite, ut extracta fufnti languinis quantitate, adliringennspergantur venarum ofculis sur fiftaanguis qui l'epenumero via melanicis præfertim: qui fanguinem habent e aquolum, cum difficultate fiftitur. X L

irudines præterez remedij caufa cor-

Pori adhibita , ait Plane lib. 35. c. to. alie quando affixa relinquant capita , quod vulnera infanabilia facit , & multos interimit ; ut contigit Meffalino Consulari Patritio, cum ad genua admilifiet : Et nos in Gallia vidimus puerum, cui ab affixis dorso hirudanibus, nullis auxiliis potuit cohibers fanguis , donec obsertt. Alis, qui pravis & corruptis featent humoribus, & qui phy nate , aut fillula circa anum fuerint aliquando correptio fi negligantur hirudinum vulnera: in gangrænas incidunt simmedicabiles ; ut notavit Gefnerus Do-Stiffmus, preferrim fi non bene purgate fuerint hrrudines , aut aliquid virulenti à lutulentis dumetis contraxerint . Sed fi ista recte pracaveantur, & remedium administretur, ut decet, mirum in modum in febre puncticulari opitulatur , & tum a vena caua, tum à venis circa hypochondria educit finguinem tetrum , & feculentum, absque considerabili virium sactura : Nec valde a circumferentia ad centrum retrabit , ut alia maiores evacuationes .

XLL

Enemata .

Omni morbi tempore utiliter inijciumtur communia semollientias humeclantias seftigerantia; de in rappu succorum ad superiora; etiam acria; ut in somnolentia nimia; aut vigilia; Caterium cum cattio-

\$5 1

Me, riec absque delectu nimis frequentes possima prodesse, cum enematum assiduitate leviter retrahantur seminaria a cute ad centrum corporis: ab acribus etiam non seviter, quin sepe crises impediuntur, & in alvum ducuntur humores inviti, cum moderatione tamen, & debito tempore iniecha naturam valde levant, ut contra humores peccantes exonerata validiùs infurgat. Aestius per prisanæ succum, ovis, & volaceo temperatum alvum humectama mochu tenet.

XLII.

Qui debet iniicere clysterem, attentus, avigilans sit oportet; ait Zacutus lib. 3. Prizi admir. observe 142. qui ex enemate actu calidisimo subsecutam mortem seribit. Bt nos certò semus, Nobilis. Heroina Diadamia Gambara. Brixia decoris & ornamento supra sexum sapientissima mubieri, mortem accelerase nimiscalidum injecum enema, quo maligna sebricum dysenteria conjuncta (proqua medicanda sueramus accersiti,) ita exacerbata est, adeò in lesam alvum debacchata bilis aruginosa, ur serpente nimium in torresacis intessinis tetro ulcere, cum omnium lacrymis diem obierit.

XLIII.

Suppolitoria quodammodo enematum efficaciam amulantur, & forfau aptius rem

perficient, dum mi us intestina efficminant, minusque à circumferentia corporisintrossum tralunt.

PHARMACIA.

SECTIO VII.

Agitur de lenientibus, preparantibus, alterantibus, potu aqua frigide. Purgante medicamento radicativo, minoratros: Goccafianes exhibendi perpenduncur.

L

Icet in bac febre prout valde communicat cum pellilenti , humores fint utplurimum incoffiles , attamen quedam preparantia debent ad ufum revocari, que fingulis coctionis impedimentis le pollint opponere: Solet enim in hac febre talis humorum mixtura reperiri, ut licet coftio. emender putredinem in una parte capacia inalia non pollit : imò agitata per coctionem humorum mixtura, exfurgunt partes quadam vaporofe aut tenues , in quibus malitia haret, quæ in vifcerum nobiltorum' intima fe infinuantes jegrotantes perdunt. Ne vos igitur effogiat ifta tam ne effaria: contemplatio aut praparantia præferibatisque reprimendo putredinem , coftionem

87

in parte coffili adjuvent. & partis inco-Cilis jam agitate pravum motum & malignitatem retundant.

II.

Sytupi B f. azinis, Portulace, Cichorii, de fueco Granatorum, Acetofus finplex; de Oxalide; de acetofistate Citri; de fueco Lintonum; de Agreffa; Ribium, Berber de Rubo Ideo, & alifervorem extinguenda acrimoniam retundendi; & difficultionem spirituum cohibendi facultate pollentes; Quibus addere oportet maiorem quantitatem aque; aut decosti Scotzonere, Scotdii; Fentaphylli; aur Hordei, ut permeent facilius;

III.

Apozemata ex decodis herbarum idem piustare poterunt; aut juscula eisdem alterata; ied jucundius, & utilius ex aquis stillatitis parate potiones i vel ex aqua kepideo mortatio percolata [quo beneficio maxime gaudent Hispali; 1 Jaddito aliquo dyrup. & pulvere cordiali; ut fins aque unc. 12. fyrup, unc. 2. pul diamarg, fr. drach.f., aut de gemmis fine speciebus; aut Margipreparat, aut confectionis Hyacinthine; additis 4, aut 5, gr. Japidis Bezoardici; atticorum Monocerotis.

IV.

His affatim uti oportet, modo non the

mox à pallu . ne coctiones interturbentur. Sic apozemata, & iuscula alterata horis commodioribus, tum matutinis, tum vefpertinis, etiam vigente accessione.

Si ad ventriculum, aut propè confluant humores, prædictos fyrupos exhibere oportet, citra tamen alicuius liquoris permi-Rionem, ne forfan eo tanquam vehiculo in loca penitiora fe condant humores prayi, quos potius per vomitum expelli optat Hipp. dum fepeexhibet cum emolumento aquam frigidam , ut vomant , biliofa enim aderune , ait 4. Epid. tex. 133.

V. I.

Petus aque frigide .

Et ne præffantiffimum , ac præfentaneum auxilium in hac febre, (præfertim fi ardens fuerit ,) intactum relinquam , rei periculofiffima, & maxime in occasione politæ doctrinam accipite. Sed moneo, ne temere hanc provinciam fuscipiatis . Infinita namque & irreparabilia damna ab uno errore exurgent; Non paucos vidi, ques repente vita privavit aqua frigida, naturali fimul cum igneo calore extincto, Valde robuftis, & fecundum partes omnes internas, præcipue nobiles, abundantibus naturali calore, tansummodo est exhibenda,

ettm febre nimirum ardentissima, sine talis sit intensione caloris, sive ingenti acumine malignitatis.

VII.

Quando propter istă impedimenta humoribus coquendis, aut cause amovende non licet medico insistere, sed neglectis his, ad sebrem extinguendam properandum esto optimum erit frigidam propinate. Nam sieri (inquit Gal.) aliquando pores, ut easti febris magnitudo, qua prasentem perniciem, nist occurras, asserat, quo easu oportebie hae prius submoca, ad submovendam cansam deinde accedere. Ego enim salium quoque non paucis frigidam dedi, suius esseratus, phlegmonas ad prasens augere, quam sinere hominem sebrem besticam incurrere.

VIII.

Nec folum hoc in cutone fieri existimetis, sed proinde in pestilenti maligna
ac puncticulari sebre, etsi non multem calor emicet, nec humorum coctio adsit, lib.
6. popul.com.1. Caloris solum, licet non
valde se exerentis, infringendi gratia, exhibuerunt veteves aquam irigidam, e amqcopiosam, que sola potest latentem illam,
ac pestiseram humorum vim cum manisesta
qualitate conjunctam mirabiliter extinguere, ideoque affatim & copiosè bibitam;
Nullam

Nullam enim certam frigide dofim expressit Galen. sed quantum egrotus possit bibere, aur quantum uno haustudagurgitare. Caterum ex etate, habitu corporis, anni tempore, & cosuetudine modum metrioportet.

IX.

Occasionem exhibendi circa augmentum querite, quando vomitus, qui per eam folet provocari non valde noceat ; alioquin in hac febre , propter retractionemhalituum pravorum ad interna , perniciofus : Vt patet ex hift. Simonis 6. Epid.com. 2. 23, Cum igitur vomitus folum in principio utilis fit, ifque copiofus effe debeat, ut fit utilis , fimulque febris adfit ingens, tune vicibus repetitis exhibeatur , ut vomatur : additis interim nonnullis, que feminaria respiciant, guttula scilicet, aceti-Sambucini , aut acerofitatis Citri , Limo. nnm , fpiritus Sulphuris , aut Chalcanthi Biliofa forfan aderunt , ait Hippocr. Sed invenire ad unguem occasionem illam. tam difficile , quam effe medicum -

X

Purgatie .

In principio est admodum necessaria:
Ante septimam, si adsint tensiones ac cruditates sa viis ductum, præcedat leniens ac detetgens medicamentum, statimingruente

gruente malo ; aut fi præ temporis angulia non suppetat occasio, inficiatur enema fatis validum ; deinde facta fufficienti fanguinis extractione, iterum repetatur medicamentum purgans fexta die, que fatis oportuna videtur ad hoc opus peragendum , nif morbus moveatur per pares : Quod maxime in principio confiderandu ut fupra diximus , Aphor. 5. feet. z. tunc purgatio in tertiam diem incidat oportat, aut in noctem ; que illam præcedit : Nam prima & fecunda dies accessione & exacerbatione febris magnopere veniunt impedita. Quod fi ante quartam non suppetat occasio purgandi, quod maxime foret expetendum ; & quidem valido medicamento; ut completa évacuatione illud faccedere posset; quod Pericli Abderitæ circa quintam; quærite occasionem; caventes fextam , propter motum maligini morbi,& feptimam propter diei dignitatem, ita ne quomodocunque moveatur morbus , fi fieri posit; id ante quartam facito. Sin minus, in motu per pares, ante fextam, quinta nimirum, vel illius nocte, in motu per impares , ante feptimam , fexta videlicet, nt dictum eft .

ΧI.

Quod tamen (ubi malignitas putredienem superat,) siat levibus pharmacis, Calsa videlicet, Manna, Tamarindis, syupo Rosarum solutivo, syrupo de floribus Perstorum de Mercuriali, Regio, euits ese-

elegantior descriptio hac eft.

Rec. infusionis Rosar. pallid. ex novem permutationibus; inf. Violarum ex decem permutationibus;

Aqua Faniculi , in qua Sena Orientalis uncia dus Patio horarum Iv. infundameur ana , lib. una.

Misceantur ista tres infusones & cum Sacchari purioris, & Manna electa ana, q. s. Fiat syrupus, additis

Gremoris Tartari, unciis duabus. ad clarificationem infiltratione per manicam. Hippocr. Dofis uncia Sex-

XII.

At in robustis ac exercitatis hominibus, ad primas venarum cruditates vacuandas, etiam insuso Agarici, aut Rhabarbari exhiberi potest, quod in delicatis & urbanis, & quibus non admodum est laboriosum... vivendi genus, nolite moliri, prasertim dum morbus propè septimam est, vel servorem jam contraltere coperit.

XIII.

Vbi verò morbus magis putredinem prodit, quam venenofam qualitatem, in delicatis etiam, iffdem utemur mediçamentis, verun prima, fecunda, velad fummum tertia die, antequam cruditates in venas maiores se insuaverine. Hoc tempore namque nondum ingresse edie

educuntur, & simul cumijs aliquid putridi humoris patiter excernitur: Vbi vero jam ingresse succint, levi pharmaco non cedunt jimò magis, commoventur, coctiones interturbantur, esserves centia augetur, ac seminaria penitius commiscetur. Quod multò minus impunè sentabitis, vigentesuccorum esterves centia, ut iam observastis. Cavero namque oporter, (dicebat. Galenus 4. de sanit. tuend.) ubi in folidis parsibus mordacia redundant excrementa, revussionem ad interiora.

XIV.

Quapropter semper purgationem ante humorum estervescentiam celebrate; nunquam tamen post septimam diem, nist decima quarta trăsacta; circa enim septimam plerumque solent apparere signa estervescentia; ex pulsuum agitatione; urinarum crassitie; aut consusone, maculis, & aliis accidentibus gravioribus; nonnullis etiam & quarta die, quibus morbus peracutus est, aut venenosa qualitate insignis, que estervescentia non cestat, donec decima quarta, aut etiam pituitosoribus; & magis melancholicis, decima septima aut vigessima prima finierint.

XV.

Dato intra hoc tempus medicamine. , semper male successit in febre pucticulari , & fæpe observaltis : Nam præter ingentem furcorum agitationem, talis orgafmus malignis humoribus imprimitur, ut à circumferentia ad centrum retracti, in nobilistima viscera quam primum irruant, caq; immani ac virulenta qualitate corrumpat: Efflorescentiæ, quæ ad cutim apparere eo tempore incipiunt, infelici palindromia delitescunt: Vesicantia, si que apposita fuerint , in quibus maxima fpes polita elt , protinus arefiunt: Frafta tandem ac motibus iffis contrariis laceilita natura, neceffe est ut corruat, & ante illum humorem, in quo major resider malignitas, victa cadat.

XVI.

- Si crasius is fuerit , (ut folet ,] educto permedicamentum tenuiori, tanquam facilius mobile ac fequaci , remanet intus alter perniciofior , ex quo infinita damna , thipores , obliviones , typhomania, foninolentia , urina suppressiones , & mille alia : Si tenuis fuerit, quia pepalmi expers & inobediens , tantum abelt, ut medicamine educatur, quiu potius effrenis factus ae turbulentior in totam humorum maffant , guin & in vifcerum ipforum humidum radicale & fubftantifieum penitius fe infinuet, fequentes postmodum totius corporis lethali colliquatione.

XVII.

Si vero violentum aliquod anxietatis, aut

aut deloris symptoma eirea ventriculum, 1:8 intestina magnopere urgeat, quod purgationem tunc temporis exposcere videatur, coacti exhibete aquam Manna, Tamarindos, aut Cassiam. Hippocrates fubpurgabat Morcuriali, ur conftat ex Cydis filii historia, cui Mercurialis decoctum forbendum dedit fexta die , & iterum undecima, non tamen impune 7. Epid. t.6. Sed. notate subpurgationem tentare Hippocratem, non integram purgationem aut lenientem : Magni momenti differentia in eis polita est, quando agitur de curatione pun-Aicularis aut pestilentis febris. Abstinete in hoc casu à trito illo electuario lenitiuo. & fyrup. Rofarum folutivo : plerumque mmis agitant propter Senam aut Polypodium, que in ifto cafu, de quo nunc agimus, numquam impune exhibentur; præfertim fi fit fyrapus ille aureus ex Rolis fil restribus moschatis, ex quibus perniciofum , violentum, & corrofivum paratur pharmacum, incuria-medicorum lob lenocinio, & fuco delicate potionis invectum, Magistratus certe decreto potius eliminandum

XIIX.

In remissione sebris & morbi declinatione spariter à validioribus medicamentis cavendum est 3 nis quod in rusticis & agrésibius hominibus aliquando operapretium erit, syrup. Ros. solutivo admissere drac, 2, vel 3, alicujus electuarij purgantis, unta juxta humoris ideam , in delicatis vero non transcendat violentia vestri purgantis dilutum Agarici, aut Rhabarbari, cum fyrup. Rofar. folutivo, fyrupo Regio, Caffia, aut Manna : Nam facile violentioribus nova excitatur effervescentia peior priori. Tanta est huius morbi virulentia, ut semper reliquiæ quædam leves longum tempus remaneant ; aliquando non ita leves , fed dolores, pertinacissimi in aliqua corporis parte fixi, ut in cruribus, brachiis, oculis. Vt in fabro lignario nuper observastis, qui in declinatione morbi strabo factus, ac tandem præ dolore oculum amisit.

XIX.

Sed de minorativa purgatione, ea scilicet, quæ per medicamentum validiffimum, aut ex mediocribus, electiyum tamen non leniens, celebratur in morborum principiis; quid timere debeatis in hac febre puncticulari, accipite & alta mente reponite: Nam multos invenietis, qui ftatim ingruente febre, indiftincte & fine delectu omnibus exhibent violentiffima. pharmaca, Scammoniata, vel Antimoniata: Vt pulveres Algarotti, Cornachini, crocum Metallorum , Gratiolam herbam , Semina Lathyridis, & similia : In febre puncticulari, ea præfertim quæ per externa feminaria introducitur, omninò ab istis abstinete. Iam vobis figna descripfi, quibus etiam primo die larvatum hunc morbum cognoscatis.

In aliis febribus putridis non malignis » turgentibus aut urgentibus fuccis , mirum in modum ifta opitulantur, fi is morbofus apparatus in orgafino constitutus eadem die educatur : Et licet maligni & venenati fucci vicem turgentium subeant, acideo quamprimum educi postulent, hoc intelligite, in excellenti putredine, aut veneno hausto, vel intus genito; aut aliis incoctilibus fuccis, ubi per cutine non incipit infectio à feminariis contagio communicatis, in hujusmodi enim febre puncticulari optimum erit, in vero principio morbi, fi Geri poffit ,valenter expurgare, & apparatum minuere , fr non vehementissimis pharmacis, faitem mediocribus ac electivis, sir enim natura supra residuum fortior fact i, illud facile vincer ac superabit: His tamen femper admiscete corroborantia, & rem valde arduam, ac periculo plenam, cum magna præmeditatione, ut docebat Hipp. peragite ..

De Alexipharmacis. SECTIO VII.

Quibus contra pravam qualitatem in bac febre pugnatur .

r.

A Lexipharmaca statim à principio sunt

No

Non quodvis alexiphamacum cuivis cor peri, febri, autaffectus temporiundifin-fee adhibendum; fed unicuique, pro veneni, humoris, febris, aut corporis natura, fuum inest proprium & peculiare alexipharmacum. Nam multis frigida vices alexipharmaci prastant, aliis calida, plerique siccas pluribus acidas & sic aliis alia, juxta rationem modi operationis veneni, aut subceti humoris, aut corporis laborantis.

III.

Alexiphatmaca necessario debent habed re manifestas qualitates putredinis, & humoris entiditionicontrarias; quoniam exturoque vitio constat hujusmodi affectus protredinoso, nimitum, & venenoso, actualizado.

T. A.

Alexipharmaci frequentius porrigendal funt, & cum cibis, "& per fe fapius, ut' femper openi feratis natura: Offerantur ut plurimum in pulverem redacts, ut' in venticulo immorentur, aut' pilulari forma: Licet quandoque, imò oportet; dum interna & recondita est contagiosa qualitas, potibus aliquid eorum admiferer.

V.

Alexipharmaca que a proprietate oc-

culta operantur, non misseantur, seorsum debent exhiberi: Sicut enim occultum est quare talem estectum & operandivim sortantur. Sicetiam potest contingere, ut sibi in ricem obstent; ut in duobus venenis succedere certum est: Quare vel unico tantum iam experto uti oportet; vel si diueris, seorsum exhibitis; done cappropriatum inveniatur.

Néc ideo existimetis, eliminandas esse in signesconfectiones bezearticas; gearum misi observantur essecus: Ianville sua-termentatione unicem temperamentum acquisi versus, scranquam unum quid simplex alexipharmacum; - fed potentius, marquamtur.

V. I.

Alexiphamacorum duplex est genus; alind pugnat adversus veneni effectum;

aliud adversus ipfum venenum:

In primo genere continentur ea, que su fua sicietate & compositione continent & sirmant mixtum, ne à sordida veneni putredine dissolvatur, ac corumpator: Vt Terra sigillata, Bolus Armena, Coralla, Cornua cervi, Rhinocerotis, Monocerotis, Sapphirus Hyacinthus, Smaragdus, Os de cordé cervi; Electuarium de gemnis, Syrupus gemmatus, Antidotus Bezoartica F. Pinne, Lapis Bezoartia F. Pinne, Lapis Bezoartia fue su veneni vites sirangunt, & comprimunt, ne ad cettra membra pergat', spiritus sirmant, & coborant, Quapropter his à printant, & coborant, Quapropter his à printant.

cipio in omnibus corporibus & naturis, & humoribus utendum censeo,

VII

In fecundo genere ponuntar, aut que fplritus veneficos urunt , diffipant , & confumunt: Vt Theriaca, Mishridatium, A ntidotus de Scordio Fracastorii, Angelica , Distamnus , Lapis Malacensis , Pulvis viperinus ; & quecunque cordialia calida , funt , aut que venero fam qualitatem refringunt & extinguunt: Qualis sunt fragida & sicca omnia cordialia . Hec fensima & paulatim adhibenda funt , pro virium imbecillitate, & quanto he firmiores suns, tanto his remediis liberalius utendum.

· VIII.

illa eriam, quia calida cum cautione exhibenda in frigidis, & febre remissa seterum maligna.

IX.

Frigida funt y veluti mica panis fucco Limonum , Arantiorum, Agrefte ; Acetofee, aut aceto madefacha ; & mare ingefta; Aceto fee folia cumaceto ; pulpa viridium Tamatindorum Saccharo condita; & multa alia frigida; in pulveris, decocti, aut pibalarum formam redacta; Alexipharmacorum pariter, que a proprietate venenis refiftunt, duplex est differentia, aut fine analogia; aut cum ea adaliquod membrum, & sunt ex natura mixtionis temperata. Primi generis sunt gemmarum, & lapidum plures; ut Granatus, qui cor respicit, Smatagdus cerebrum, Saphirus hepar, Corallia ventriculum, Topazium Theriacæ præsert Serapio Achates & Margaritæ omnes, adversus peltem valere creduntur; coran Monocerotis pariter, Coccus Maldivensis, radices Authoræ, Contrayervæ, & aliæ,

XI.

Hydrargyrum pectori appensum, genniuo, & latenti odio venena sigat: Hincest, quod dulcisicatum, & auro praparatum, un decet, mirum in modum in hacsebre puncticulari, pro expurgandis pravis ac deleteris humoribus, ad grana 15, & ultra exhibitum, cum conserva aliqua solutiva optuletur.

XII.

Lapis Bezoar, tum Orentalis, qui fituerit legitimus, certe prevalet; tum Occidentalis, qui minori efficacia, sed majori violentia operatur. V terque utilis, vel quotidie in parva dosi exhibitus, vel prociendo sudore, occasione debita; in maroz DS FEB. MALIGO jori quantitate cum aquis cordialibus hauflus.

XIII.

Dosis tamen hujus alexipharmaci diligentiori perpendatur examine. Multos namque vidimus, qui hujus fine ullo delectu ingentem granorum copiam exhibentes, tantum abelt, ut gaiequam profuetint , quin potius in ruinam inemendabilem egerint miferas languentes, auxilium infamantes, quod aliis fuisset saluti . In. quotidiano usu cum pulveribus cordialibus, unum vel alterum gr. Orientalis ufurpate, Occidentalis vero ad tria grana cité citer; quam normam in præfervatione fub pestilenti constitutione inviolabilem obfervant Indi, quin & Hifpani, autoritate Monardis, & Oropefæ Hispalensium; Salcedi, & Alvaris Luftanorum peritiffimorum , nec non Garcia ab Horto, cujus Dialogi è Lustano idiomate in Hispanum, & Latinum ofcitanter translati , & vitiose excusi, in errores perniciofos, circa huius veram dofim, Clufium, & alios interpreetes impulerunt .

XIV.

Si tamen opus suerit, sopitam naturam ad crisim, præsertim per sudorem excitare, exhibete ad 7. gr. Orientalis, vel ad 10. Occidentalis, in aquis appropriatis: prét temére, hoc limites transcendatis, quirquid uno, vel altero exemplo ingest

Zacutus obser. 35 lib. 1. de Med. princ. hift. Prævalest apud vos doftrina Galeni -1.5. imp. med. c. 18. dicentis : Sianidem 1 facultates, que deleteria medicamina alserant , naturam habent mediam inter corpora perpetientia , & medicamenta ip- 1 faladentia, ut videlicet eadem fit pro-Partio carporis ad facultatem alexiteriams qua illins ad deleteriam , Grurfum dele. tery ad alexiterium, qua alexitery ad poepus : Ea propter propemodum omnia : que deleterits adversantur; si largius Sumpta fuerint , graviter corpus animantis obledunt . Quamobrem en moderatione quantitatis omnes id genus facultates exhibere oforset, ut negs copia nimia conpus offendant , neque exiguitate sua deleteriis vincantur.

XV.

Secundi genetis sunt, quæ etiam cum shumoribis analogiam habent, veluti calidis, & æstuantibus sebtibus eleæt. ex tribus santalis, Damargariton frigidum, Trochisci de Spodio, de Terra sigillata, de baccis Oxyacanthæ, &c. strigidis vero, Theriaca, Michridatium, Diarhodon, Alchermes, & alia similia.

XVI.

Multa etiam alia funt, que omnibus humoribus analoga & communia funt: veluti

XVII.

Confectio Hyacinthina. Rec. Hyacinthorum elett. une. fem. - Boli Armene aqua rofacalosa, Terra figillata. Dictamnia Tormentilla. Carline, Been albi . gubri , : Spica nardi, ana drachm. it. Nuclearum nucum Inglandium, minimè rancidorum ; Troch. de Camphora , ans drab.i. f. Gran. sindlorum . Croci, Gentiane . Myrrha. Rolar. rubrarum 1 Santatorum omnium

Sem. Iuniperi ,

Rafara Eboris ; Cornu cerviusti ana drac. i. Ossa de corde cervi ; n. ÿ. Scm. Citri mundat.

Acetofe, Bombacis,

Portulace, and drach.ff.

Sapphirorum , Smaragdi ,

Margarit.

Serici crudi , ana scrup. y.

Sem. Ruta;

Santonici an scrup. i. Ambra grisea » scrup. ij. Moschi Orient. scrup.iij.

Fol. Auri

Argenti, and num. XII.

Cum Syr: de acetoftate Cieri fiat confe-

XVIII.

Confectio Hyacinthina Neapolitana. Rec. Hyacinth. Orient. drach. i.ff. Smaraedi,

Sapphiri, Topaziorum,

Rubinorum, ana drach. y.f. Margarit, utr. ana scrup. y.f. Corall. rubr.

alb. ana drach. ff.

Spody,

Rafura eboris, Ligni Aloes, ana drach.

E S O

Offis de Corde Cerui , Cornu cerviusti , Sem. Portulaes ,

Coriandri Praparo Acetofa, Been, albi

Been. albi ,

Rad. Distamnis Tormentilla,

Terresigillata >

Rofar.ana drach. i. ferup. ij. Sem. Citri drachm. ij.

Fol. Auri, n. XXX. Moschi,

Ambre ana gr. X.

Cum Syrnp Limenum q. f. Fiat confest.

XIX

Confectio Hyacinthina Hetrusca.

Smaragdi , Sappheri

Topaziorum,

Granatorum.

Margaritarum . Lapidis Bezoar o

Corall.rubr. preparatori unicornu, una scrup. ÿ.

Cornu Cervi Philosoph.prapa. dr.i.
Boli Armens

Terrafigillate .

Rad,

Rad. Dictumni albi. Tormentilla.

Angelica . Vincetoxici s Contragerva . Biftorte .

Carlina,

Scorzonere .

Rofar.rub, and drach.i. fr forut. ija Rafura Eboris a drach. [.

Lieni Aloes , drachm. y.f. Offis de corde Cervi n. VIII.

Cinamomi,

Caryophyllorum , Corticum Citri .

Scordii .

Som. Acetofa , Sem. Endivia. Portulace >

Cardui benede Hi .

Rute Caprarie , Coriandri preparate s

Santalorum omnium Croci : gr. XV.

Sem . Citri , Scrup. TV. Fol. Auri , n. XXX.

Ambra gryfer , forup. i. Moschi gr. VIII.

Cum syrup. de fucco Limonum 4. f. fiat Confectio.

Antidotus Bezoartica Francisci Ponar Veronentis Archiatri +2.5

Rec. Lapid. Bezoar Orient: legitimis Pavonii, feu Taos; Malacents ex felle Hiftricis, unicorna legisimis Margaritanum Orient: preparato ana drato, (f...

[Margarite multiplicentur deficiente Pavonto & Malacenti, pondere illorum; fed ex confentu & exado Authoris examine, loco Malacentis & Pavonti, propter pretium & raritatem suostituerem tophum Cervicapræ, singulari & experta efficacia Histricis lapidis æmulum)

Fol. Auri , n. L. Terra figillata ,

Boli Armene lutea Orientalis , Corall. rubr. praparati ,

Smaragdi Orientales praparati, [Nam Occidentales habent aliquid cor-

rofivi :] ana drach-ij-Scorzonera Hifpanica vera drach-VI. Tormentilla munda recensis,

Anthora, Bistorta, Pentaphylli, Contrayerva,

Angelica , Pimpinella ,

Eryngij , ana drach. ij.

Cort. Citri, maturorum, in umbra

Florum Citri mondum exclutorum :
- Sem. Citri reconter prepiuna dracij.

140

baccarum Lauris,

Inniperi ana drach. iij. Cardni Benedictio Dictamni Cretici : Calaminthe montant Rutas Scordy veri Cretonfis , and drach. V. Agallochis Zedoaria , Galanga minoris > Cinamomi eletti . Caryophyllorum , Crocs Corycy, and Scrup. 4. Sem. Ocymi . Amomi veri, ana drach. ii. Rute . Hypericonis,

Althea, and drach if. Opobalsami legitimi ; Thereace Andromachi recentisa Confectionis Alchermes Mithridaty , Confectionis Hyacinchina, ana unc.ff. Mellis Attici despumate , libr. y . 6 unc. iu. M. F. Elect:

XXI.

Confectio de Bolo Armena. Rec. Boli Armene parifima , agua Rofa-. rum lota , unc. f. Radicum Tormentilla, Angelica , ana drach. ij. Corall . rubrorum , Rasura Eberis COTTE

Cornu Cervi , Rosar. rubrar. ana drach. j. Sem. Melonum ,

Acetofa.

Tuniberi

Bombacis mundatio ana drach i ff. Anisi

Faniculi,

Ginamomi, Xyloaloes, aut Smotali Citrini, &

Maceris s and drach. f.

Fizt pulvis qui usui servesur, ex quo'cum Saccharo in aq. Seobiose, autaliacordiali disoluto & Gum. Tragac. aunt Trochisci, quorum drach semis suntun ex june pulli, aut aquis supradichis.

XXIL

Iulep. fine Extractum Geramatum M. D. Rec. Topaziorum,

Smaragdorium;
Rubinorum;
Sapphirorum;
Hyacinthi;
Sarda;

Corall. rubr. and drach. y.

Supra Porphyritem lapidem in senuisimum pulverem redacha aceto destill. terq. rectificato excepiuntur, & modo quo Margaritæ præparentur, - postea fragmenta pretiosa sic græparata ponantur in matracio vitre o oblongi colli, quibus supereponatur acetum destillarum, & rechiscanum, opt inpernatet duabus digitis; claudatur optimė, & in B. lucerna ponatur ad tinflure.extractionem f.a. qua tinctura in urinali ponatur, & per B. evapotetur omnis
humidatas, & remanebis lapidum extradio, cui fuper fundatur aqua Naphæea.
quantitate., ex qua dulecicat extractum &
omnis remo veatur falledo. Deinde

Rec. Moschi Orient. drach. iy.

Ambra grysea elett. drac. ij.

Aque vira, ex vino Malvatico extra-Ha, és ter redificata; nue. iy. Extrahe magisterium, sue extractum sa. in B. M. & hoc serva seorsum, sicut saillud genmanum. Postea

Rec. Elettuar. Alchermes une . J. de Gemmis , unc. i.ff.

de Hyacintho unc. i. Aque Naphe. lib. ÿ. ff.

Aque Napara to v. y. y. Misce, digere, & f. a. Achilla per B. M. ad fecum ficcitatem, cui aque ad confidentian Syrup: Tuncremove ab ignesse et immisce Extra llum Mosci, Ambra, & Gememarum, supradictarum, & omni diligentia fat Iulepus, cujus dossa gutt. X. ad XX. per E., vel cum aqua aliqua cordiali, aut jusculo, secundum agrotantis exigentiam; quapropetr sepius in die, secure potert existeri.

.IIIKK

Aqua Cord. Sanonia vitriolata

Buglossa,
Melossa,
Bistorta (
Verbenaca,
Oxylapati,
Acetosa,
Rute Capraria,
Myrrhidis,
Cyani maioris & minoris,
Rosaum,

Citri ana uno. VI.

Limenum ,

Succi Pimpinella, Pentaphylli, ana unc.ių. Aceti Vini albi lib.i. Sem. Portulaça, Flor. Nymphea, anna unc.ų. Terra Lemnia,

Armena, ana une, i.

Sem. Citri, unc. semis, Spec. Diatrion santal . drach. VI.

Marg. prapar. cum acido Gieri drac.iy.
Infundantur, species an succes, & sacta...
paceratione per tres dies, destilientur
per Alembicum vitreum: Hujus aq.exhibetui unc.; mane, & altera sero Sed Fonfeca illam sic corrigit, abstinet ab aceto.
Citri, & Limonis succis, sine quibus defillare facit ipsam aquam; additis succi
Scorzonere unc. a delfillatam aquam reddit acidulam per essentiam Vitrosi, adiiciendo pro singulis uncis aqua, guttam

anam prædickæ estentiæ: Nam aciditates Vitrioli, Sulphuris, & Metallorum mnltö præstantiores iunt vegetabilibus, & magis veaenum oppugnant, penetrant, refrigerant, obstructiones tollunt, urinas, & siedores promovent: Hoc modo correcta mihi magis arridet; propter rationes allatas; Hac utimini, quæ poterit exhiberi ad 2. vel 3. cochlearia, per horam ante prandium & antecœnam.

.XXIV.

Antidotus de Vnicornus dicata Philippo II. Hifp. Regi. Rec. Cornu Menocerosis weri drach. i. ff.

Tormentilla;
Galanga;
Enula campana;
Cortic. Fraxmi;
Iridis Illyrica;
Rad. Caryophyllata;
Eryagy;

Been albi, Grubri, ana drachay. Baccharis,

Trifoly Afphaltitis tecentit ... Mentastri .

Scordij •

Betonica •

Verbena •

Melissa • ana • ss.

Sem. Coriandri .

Card. Santi

Citt

Citris

Paonig, ana unc. s.

Paonig, ana unc. s.

Succi Cyrenaici. drach. ij.

Xy oalaes scrap. ij.

Osis de corde Cervi, n. iiij.

Gran, tintt.

Lacce lote, ana drach. i.s.

Spice drach. ij.

Serici crudi drach. i

Tere sejilate, ana. i.

Fol. duri, num. IV.

Cinamomi drach. ij.

Zingib. drach. ff.
Excipe cum Sympo de Ribes, vel neido Ciexcipe cum Sympo de Ribes, vel neido Ciexcipe cum Sympo de Ribes, vel neido Ciexcipe cum confectio f. a. Ab
Epidemico aere custodit, putrediuem inhibet, vifcerum obstructiones aperit, valet contra passiones cordis & exanthemata pellit.

XXV.

Pulvis Alexipharmacus Forefii.
Rec. Radic. Dictamni,
Tormensille,
Boli Armene Preparate cum
lotione aque Scabiofe,
Terrafigillate, ana drach. Vi.
Radic. Gentiane,
Rad. Angelica,
Tunice, ana drach. j.
Santali rubri, drach. j.
Rafure Eboris
Cort. Citri,
Cort. Itti

Ossis de corde Cervi,
Zedorie,
Zedorie,
Margaritarum Oriental.
Been urius si ana serup: ÿ.
Fragmentora V. pretiosovi ana ser. t.
Gornu Rhinocerotis,
Succini albi, ana serup. s.
Fol. Auri ep

Argenti, ananum. ij.
Misce siat pulvis tenuissimus, cujus exhiberi potest scrup, i. perhoram ante cibum cum aqua cordiali aut jusculo.

XXVI.

Alius Ducis Mantue Caroli.

Rec. Magifery Ferlar Corall. ana drac.y.
Cornu cervi Philosoph. prepar.unc.ff.
Contrayerve drach.V.
Semin. Cardui beneditti:
Ossis de corde cerviana drach. i:
Lapid. Bezoar. occident. drach.ff.
Rasura Cornu Rhinoceros. scrup.i.
Fol. Auri scrup. ff.
Misce bat pulvis, cujus usus ut alterius.

XX V I I.

Sal, Extractum, siue Magisterium Ciesi.
Rec. Succi acidi Cieri depurasi une. IV.
Theriace unc. i.
Michridarij unc.ij.
Boli Armen. Oriene.

Terre figill.

Terre

Terre Nocerens. ana drac. iÿ. Spec. Electuary de Gemmis . Rad, Angelice ,

Scorzonere . -Tormentille : Anthorg,

Contrayerve, Dictamni albi ,

Baccarum Lauri ana unc. f. Lactic Sulphuris , Magisterii Margaritar. Pulver. viperini : Tophi Cervicafre, Offis de corde cerui , vel Cornu Cervi philosophice praparati .

Cocci Maldiuenfis, & Eboris similiter preparatorum :

- Corall, rubr. prepar Sem. Citri ,

Lapidis Bezoar. Orient.ana drach.ij. Pul-erifatis pulverifandis mifceantur omnia, & includantur in tribus aut quazuor Citris excavatis , extracta tantum medulla acida, contegantur fuis opercufis, & sufolentur per 8. vel 10, dies Deinde in mortario lapideo cum pistillo ligneo contundantur ; bene contufis affundatur aqua Naphæ, reddita acidula cum Spiritu Sulphuris , rc Vitrioli , (& fi fieri poffet; ante appolitionem fpirituum reddita amara per intufionem lapidis Malacenfis) ut suppernatet digitis 4. & ponatur in digeflione , donec extrahatur Tinctura ; feparata aqua, alia interum affundatur, & toties repetatur, donee nihil amplius tingatur : tunc fortiter exprimatur materia, & quod exprimitur immisceatur aquis tin-Ais, & destillentur lento igne, in B. M.ad ominimodam exficcationem, remanet in fundo previofissimum magisterium, Refiduum expressionis calcinetur, & ex cinere fiat lixivium, ut extrahatur Sal, quod conjungetur cum dicto magisterio in cucurbita relicto, ac servetur ad usum : Dosis erit à scrup. Poterit etiam parari Ele-Auarium, ex reliduo à materia fupra expresia, & extracto in fundo cucurbitæ relicto; fi non ducatur ad exficcationem, fed in extracti confistentia relinquatur, addito Iulepo aliquo cordiali; puta de Pomis, de corticibus Citri & similibus, cujus dosis erit drach. ij. cum hanstu 'aquæ alicujus cordialis. Vel etiam ex solis secibus in expretlione dictorum Citriorum relictis, fine mixtura extracti, cum Saccharo potel fieri Electuarium pro pauperibus.

XXXVIII.

Multa alia sunt pressantissima alexipinaimaca; composita seu antidoti, que possea describi; ut Antidotus de Seordio Fracastorij, Bezoar artissiciale Prevotii. Magiserium Viperarum; de quo alibi susius savente Deo agemus, compositio illa mirabilis Regum Indorum a Zacuto descripta, dica Cachunde, que in hac sebre cumratione, & oportune usurquata mire prosunt

DE FEB: MALIG.

De his igitur fatis sit dictum, ut devenismus ad cortigenda symptomata, que hanc: febrem solent:comitari...

De symptomatum correct..

SECTIO, IX.

T.

Nter membra, que citissme hujus vernence. febris contagium suscipium; ventriculus sand est, qui monnauses corriptum; sibi fastidio dolore, ac procedente morbo, fingultu; idque prius; quandiud membrum; fortase qui arro excrementis caret; in quibus promptissime suscipium veneni mala qualitas.

II.

Itaque curandum primo est, ejus excrementa levi alique pharmaco deponere, vel clystere paulò acriori sa tum un finguinis missioni lòcus supersit; tum une morboso apparatui propriis excrementis materiam suppeditet: tum vero ut topicis auxiliis, si quando opus suerit; lòcus subsit;

III

Ab alvi subductione oportet venenof sillos

illos halitus, aut humores eadem labe feedatus, aut divertere , ant corrigere , aut extinguere. Quapropter naufea, faftidio, vomitibus, aut dolore existentibus, oportebit ventrem bis in die perfricare, donec rubefcat, aut inungere oleo mirabili de. Scorpionib: Matthioli'. Probatum magis est halitus fett humoris malitiam, aut feruid a aqua difcutere & retundere , autacidis & frigidis apozematibus extinguere & frenare'. Quem ufum præftat fuccus Agrefine cum Saccharo, & aqua Portulaca, aut panis mica eodem fucco; aut Oxalidis imbuta: Mali Granati acidi quoque foccus panis mica exceptus; aut fuceus Limonum; . cum Saccharo , & aqua Scorzonere, aut Portulace frigidissima: Item paruin aceti valde diluti in aqua Cucurbite, aut Acetofe .

IV.

Quod si humoris acris, & erodentis aliquid præeste ibidem nobis suerit compertum, levissimis medicamentis, aut alimentis & jusculis rem'agere oporter, velitti est alica, ptisana, amylum, mucilagines seminum Cydoniorum, & Psyllij cum Saccharo & modico aceto consecta, oleuna Amygdalarum dulcium recenter sine igne extractum, & cum foliis Auti exhibitum, quibus interim aliquid ex Alexipharmacis miscere oportet.

Cavendum in hac re est ab iis , que vul-

re imbuta.

V 1.

Quod si compertum suerit ventriculum calidis gaudere, aut in eodem esse viscidi. & crassi humoris aliquid, aut susticientimatius calore carere; adhibere tuto possimums parum. Theriacæ aqua Scordis dissoluta; aut pulveris viperini grana aliquot, puta. vi. aut vis. cum tantillo Salis Absinthis in prædicta aqua: Si calidus supramodum suerit venter, & humores plus justo feruidis, aliquid ex frigidis adhibete, sicut confectione ex Santalis Mazistarium Margaritarum & Corallorum, cum paucis granis Salis Citris, cujus mentio sacta superius secto. 7. Aph. 27.

VII.

Eodem modo in fingultu-resfieri debet, præterquam quod irr eo , dum plurimum laborans defatigatus labitur , devenire ad opiata non erit abs re. Ad hoc compertum eft plurimum valere, fi præbeatur Syrup.ex fucco Portulacæ, aut ex Papavere, aut emulfo 4. feminum frigidorum majorum: Verum his præmiffis, non erit præter rationem Philonij, grana decem cum Saccharo Rofaceo commissa præbere, dum vitæ periculum impendet, fi res differatur, alioqui minimè, aut cautè, Securius tameta potest.

potest: exhiberi Laudanum Nepenthes Quercetani, aut duo vel tria grana, in quo Opium adeo Alexipharmacis corrigitur, ut nullo pasto nocere possit. Monachum febre maligna singultuosa correptum, curatum vidistis ab exhibito oleo Amygdal, dulcium, & cucurbitula supra regionem, ventriculi cum profunda scartscatione assistante.

LIIV . P ...

Virium interim habenda cura jusculis, odoribus, modici vini irroratione. Alexipharmacis,

Cordi etiam fimmopere providendum faculis ex ferico confirectis, intersutis cum speciebus cordialibus tempetatus; exempli gratia ad unc. 1. seminum Citri o Acerose, florum Buglosse, Borraginis, Rosarum rubarum ana unc. semis. Camphora serup, unum. Santalorum rubeorum drach. i. Potest addi pulveris radicis Angelice, Bistorte, foliorum Scordij ana drachma semis.

IX.

Licet etiam cordis regionem inungere aqua ista Theriacali.
Rec. Theriaca,

Confectionis Hyacinching and unc. i. Dissolvantur in

Pimpinelle ,

Suc. Scabiose, & Acetose,

die DE PEB. MALIG.

Cornu Cervi , Rosar. rubrar. ana drach. j. Sem. Melonum ,

Acetofa.

Citri excorticati .

Bombacis mundatio ana drach i ff. Anisi

Faniculi,

Ginamomi, Xyloaloes, aut Santali Citrini, &

Macoris : non deach. f.

Fiat pulvis qui usui servetura ex quo cum Saccharo in eq. Seebiose, aus alia cordiali dissoluto, & Gum. Tragac. sunt Trochisci, quorum drach. semis sunaturex jure pulli, aut aquis supradichis.

XXIL

Iulep. fine Extractum Genanatum M. D. Rec. Topaziorum,

Smaragdorient ; Rubinorum; Sapphirorum; Hyacinthi; Sarda;

Corall. rubr. and drach. y.

Supra Porphyritem lapidem in tenuissimum pulverem redacta aceto destilla terque redificato exceptuntur, & modo quo Margarite praparentur; possea fragmenta prettora sic presparat ponantur in matracio vitreo oblongi costi; quibus superpomatur acetum destillatum, & redificatum,

optime, & in B. lucernæ ponatur ad tincture extractionem f.a. que tindura in urinali ponatur, & per B. evaporetur omnis humiditas, & remanebit lapidum extractio, cui super sundatur aqua Naphæ ea., quantitate, ex qua dulcescat extractum & omnis removeatur salsedo. Deinde Rec. Moschi Orient. drach. iii.

. Mojeni Orient. aracu. 19. .Ambra grysea elect. drac. ij.

Aque vira, ex vino Malvatico entra-Aque vira, ex vino Malvatico entra-Extrahe magulterium, sue entractum f. a. in B. M. & hoc serva seorsum, sicus scillud gemmaium. Postez

Rec. Electuar. Alchermes unc. ij. de Gemmis, unc. i. s.

de Hyacintho unc. i. Aque Naphe. lib. ij. ff.

Agte Napot. 10.5.13.

Misce, digere, & f. a. deltilla per B. M. ad fecum ficcitatem. cui aque addes accharicandidi lib.ii. & coque ad confisentiam. Syrup: Tunc remove ab ignes e ei mmisce Extraslum Mosci. Ambra. & Gemiamarum, supradictarum, & omni diligentia stat lulepus, cujus doss a gutt. X. ad XX. per se, vel cum aqua aliqua cordiali; aut jusculo, secundum ægrotantis exigentiam; quaproptet sepius in die. secure potert exhiberi.

.IIIKK

Buglossa,

Bistorta

Verbenaca, Oxylapati,

Acetofe ,

Rute Captaria,

Cyani maioris & minoris

Citri ana une. VI. Limenum

Succi Pimpinella,

Pentaphylli , ana unc.ių. Aceti Vini albi lib.i.

Sem. Portulaça

Flor. Nymphea anna unc ij.

Terra Lemnia,

Sem. Gitri, unc. femis,

Spec. Diatrion Santal . drach. VI.

Marg. prapar. cum acido Gieri dracciy.
Infundantur, species in succis, & sacta.
maceratione per tres dies , destilientur
per Alembicum vitreum : Hujus aq.exhibetui unc. j.mane, & altera sero Sed Fonseca illam sic corrigit , abstinet abaceto .
Citri, & Limonis succis, sine quibus destillare facti ipsam aquam , additis succi
scorzonera unc. 2. destillatam aquam reddit acidulam per essentiam Vitriolis adiiciendo pro singulis uncis aqua, guttam
unam

unam prædickæ estentiæ: Nam aciditates Vitrioli; Sulphuris; & Metallorum mnlto præstantiores sunt vegetabilibus; & magis veacuum oppugnant; penetrant; refrigerant; obstructiones; toslunt; urinas; & siedores promoventi-Hoc modo correcta mihi magis arridet; propter rationes allatas; Hac utimini; quæ poterit exhiberi ad 2. vel 3. cochlearia; per horam ante prandium & antecœnam.

XXIV.

Antidotus de Vnicornu, dicata Philippo II. Hisp. Regi. Rec. Cornu Menocerotis veri drach. i. ff.

Tormentilla,
Galanga,
Enula campana,
Cortic Eraxini,
Iridis Illyrica,
Rad. Caryophyllata,
Eryagy,
Form olbi, do nubus

Been albis & vubri , and draches; . Baccharis , Trifali Albhaleic cacaneis

Trifoly Afthaltitis tecentis a. Mentastri

Scordy .

Betonica :

Verbena .

Melisse, ana m. s. Sem. Coriandri :

Card. Santi

Citt

114 DE FEBR. MALIO.

Citris
Paonie, ana une. ff.
Succi Cyrenaici. drach. ij.
Xy'oalaes ferup. ij.
Offis de corde Cervi, n. iiij.
Gran. tintt.

Lacce lote, and drach i ff. Spice drach y. Serici crudi drach. i

Terre figillate, uns. i. Fol. Auri, num. IV. Cinamomi drach. y.

Excipe cum Sympo de Ribes, vel acido Cieri, & Saccharo, & flat Confectio f. a. Ab Ppidemico acte cultodit, putrediuem inhibet, vificerum obstructiones aperit, valet contra passiones cordis & exanthemata pellit.

XXV.

Pulvis Alexipharmacus Foresti. Rec. Radic. Distamni.

Tormentille,
Boll Armene Preparate cum
lotione aque Scabiole,
Terrafigillate, ana drach, T.
Radic, Gentiane,
Rad. Angelica,
Tunice, ana drach, j.
Santali rubri, drach, j.
Rafure Eboris,
Cort. Citri,
Gorall, rubri,

1115

Ossis de corde Cervi.;
Zedoárie;
Margaritarum Oriental.
Been urins 9; ana scrup. 9.
Fragmentor V. Pretioford ana scr. 1.
Cornu Rhinocerosis;
Succini albi., ana scrup. sf.
Fol. Auri ro.

Argenti, ananum. iji.
Misce fiat pulvis tenuissimus, cujus exhiberi potes serup, i. perhoram ante cibum cum aqua cordiali aut jusculo.

XXVI.

Alius Ducis Mantue Caroli.

Rec. Magifery Feelar Coril. ana draciy.
Cornu cervi Philosoph. prepar.unc. f..
Contrayerve drach. V.
Semin. Cardni beneditti:
Offis de corde cerviana drach. i.
Lapid. Bezoar-occident. drach. ff...
Rafura Cornu Rhinoceros. Scrup.i.
Fol. Auri Scrup. ff.
Misce fiat pulvis, cujus usus ut alterius.

H w

XX V I I.

Sal, Extractum, sine Magisterium Citri.
Rec. Sieci acidi Citri deputati une. IV.

Therineg unc. i. Michridaty unc.y. Boli Armen. Oriens. Terra figill.

Terre

US DE FEB. MALIG.

Terre Nocerens. ana drac. iÿ. Spec. Eleduarÿ de Gemmis, Rad, Angelice,

Scorzonere,

Tormentille:
Anthore,

Contrayerve, Distamni albi,

Baccarum Lauri ana unc. ff.

Lactis fulphuris, Magisterii Margaritar-Pulver, uperini, Tophi Cervicafre,

Offis de corde cerui vel Cornu Cervi philosophice praparati a

Cocci Maldiuensis, &

Eboris si militer preparatorum ; Corall, rubr. prepar

Sem. Citri .

Palverifatis pulverifandis mificantur omnia, & includantur in tribus aut quatuor Citris excavatis, extraca tantum medulla acida, contegantur futs operculis, & infolentur per 8. vel 10, dies Deinden in mortario lapideo cum piñillo ligneo contundantur; bene contufis affundatur aqua Naphæ, reddita acidula cum Spiritu Sulphuris, ze Vitrioli, (& fi fieri poffet; ante appositionem spirituum reddita amara per infusionem lapidis Malacensis) ut suppernatet digitis 4. & ponatur in digefione, donec extrahatur Tinctura; separata aqua, alia interum affundatur, & to-

ties repetatur, donec nihil amplius tingatur : tunc fortiter exprimatur materia, &. quod exprimitur immisceatur aquis tin-Ais, & destillentur lento igne, in B. Mad ominimodam exficcationem, remanet in fundo pretiofifimum magisterium , Refiduum expressionis calcinetur, & ex cinere fiat lixivium, ut extrahatur Sal, quod conjungetur cum dicto magisterio in cucurbita relicto, ac servetur ad usum : Dosis erit à scrup. Poterit etiam parari Ele-Auarium ex reliduo à materia fupra expresta, & extracto in fundo cucurbitæ relicto; fi non ducatur ad exficcationem, fed in extracti confistentia relinquatur, addito Iulepo aliquo cordiali; puta de Pomis, de corticibus Citri & similibus, cujus dofis erit drach. ij. cum hanstu 'aquæ alicujus cordialis. Vel etiam ex folis fecibus in expretsione dictorum Citriorum relictis, fine mixtura extracti, cum Saccharo potel fieri Electuarium pro pauperibus.

XXXVIII.

Multa alia sunt prestantissima alexipinarmaca; composita seu antidoti, que possea describi; ut Antidotus de Seordio Fracaflorij, Bezoar artissiale Pravottii. Magisterium Viperarum; de quo alibi susus savente Deo agemus; compositio illa mirabilis Regum Indorum a Zacuto descripta, dica Cachunde; qua in hac sebre cuarratione; & oportune usurpata mire prosunt

DE FEB MALIG

De his igitur satissit dictum, ut devenismus ad corrigenda symptomata, que hanc: sebrem selent:comitari...

De symptomatum correct.

SECTIO, IX.

I

Nter membra, que citissime hujus venenose sebris contagium suscipiunt, ventriculus sancest, qui monnanse corripitur, cibi fastissio dolore, ac procede, te morbo; singulsu; idque prius, quanaliud membrum, sortasse qui araro excrementis caret; in quibus promptissime inscriptur veneni mala qualitas.

II.-

Itaque curandum primo eff, ejus excrementa levi alique pharmaco deponere, vel' clyftere paulò acriori ; e tum un tanguinis' miffioni locus fuperfit; tum me morbofo apparaturi: propriis excrementis materiam fuppeditet: tum vero ut topicis auxilis; fi quando opus fiierit; locus fublita

LIL

Ab alvi subductione oportet venenofis illos

illos halitus", aut humores eadem labe foedatos, aut divertere, aut corrigere, aut extinguere.Quapropter naufea, fastidio, vomitibus', aut dolore existentibus, oportebit ventrem bis in die perfricare, donec rubefeat', aut inungere oleo mirabili de Scorpionib. Matthioli'. Probatum magis est halitus fett humoris malitiam, aut feruid a aqua di scutere & retundere ; aut acidis & frigidis apozematibus extinguere &: frenare'. Quem ufum præftat fuccus Agrefine cum Saccharo, & aqua Portulacie, aut panis mica eodem fucco, aut Oxalidis imbuta: Mali Granati acidi quoque foccus panis mica exceptus; aut fuccus Limonum; . cum Saccharo , & aqua Scorzonere , aut Portulace frigidifima : Item paruin aceti. valde diluti in aqua Cucurbite, aut Acetofe .

IV.

Quod fi humoris acris, & erodentis aliquid præesse bidem nobis suerit compertum', levissimis medicamentis, aut alimentis & jusculis rem'agere oporter, veluti est alica, pti sant, amylum, mucilagimes seminum Cydoniorum, & Psyllij cum Saccharo & modico aceto consecta, oleuma Amygdalarum dulcium recenter sine igne extractum, & cum foliis Auti exhibitum, quibus interim aliquid ex Alexipharmacis, miscere oportet.

Cavendum in hac re est ab iis, que vul-

potest exhiberi Laudanum Nepenthe Quercetani aut duo vel tria grana in quo Opium adeo Alexipharmacis corregitur, ut nullo patto nocere possit. Monachum febre maligna singultuosa correptum, curatum vidistis ab exhibito oleo Amygdal, dulcium, & cucurbitula supra regionem ventriculi cum profunda scarificatione assis.

VIII.

Virium interim habenda cura jusculis, odoribus, modici vini irroratione. Alexi-

pharmacis :

Cordi etiam fummopere providendum facculis ex ferico confiructis, intersutis cum speciebus cordialibus temperatus; exempli gratia ad unc. 1. seminum Gutri e Acetose, florum Buglose, Borraginis, Rosarum rubrarum ana unc. semis. Camphora serup, unum. Santalorum rubeorum drach. i. Potest addi pulveris radicis Amgelice, Bistorte, foliorum Scordij ana draachma semis,

IX.

Licet etiam cordis regionem inungere aqua ista Theriacali.
Rec. Theriaca,

Confectionis Hyacinching and une. i. Dissolvantur in

Succo Scordy, Pimpinelle,

Suc. Scabiofe, & Acetofe,

DE FEB. MALIG.

extradis cum Agnarofacea ea quantita-

Pulv. Cinnamomi drach. i. Santalorum omnium , unc. i.

Pulv. Diambre.

Diamoschi ana drach. ff.

Diamargarit. frigidi , Electuary de gemmis sine speciebus

ana drach. i.

Mitce sum uncips fex succi Pomorum duleium redestentium, & in alembicum immissa distillentur per B. M. Hujus mirabilis est esticacia procorde: quod etiam a præsta Oleum Masthioli., & Epirhema Cordiale ex unquenti florum Auvantioeur; unc. i. Olei Scorpionum Matthioli drachi. Specievum Diamargarit. frigidi drach. sp.

100

Nec erit importunus usus epithematis cordialis hujus.

Rec. Conf. Alchermes drach. i.

Theriace drach. f.

Pulv. Magiftenÿ Perlärum; Hyacinth. Curnu Gervi Preparari, ana scrup. ff. Lapid. Bezoartici Orient gran. ÿ.

Diffolvantur in

Aqua Scorzonera, Accesofe, anaunc, ÿ.

Vini Malvatici; unc. IV. Misce sat Epithema, cum serico applicandum cordi.

XI.

Delabitur sapissime humor ad intestina, estatque alvum aliquando excitata dysenteria, chi protinus omni arte succuremanum est leui purgatione ex Rhabarbaro sacta a providendum etiam est, non adstringentibus, sed Alexipharmacis, & alimentis tenuioris & facilioris substantie ut nule lo negotio, & brevi tempore natura illa, conficiata

XII.

Mihil in hoc morbo frequentius Verminatione: Facilime enim generantur lumbrici a maligna putredine, unde tantò pejoris funt natura, quanto peiorem fur principii redolent originem, perniciofora nulte producentes symptomata, quam qui absque tali sebre quotidie in pueris, generantur: Atroces namque solet proceare capitis dolores, deliria, epilepsas, aphonias; supores, cordis palmos, tuses ferinas; quin & ipsum ventrem pers rasse; quin & ipsum ventrem pers rasse; quin & ipsum ventrem pers rasse; quin estimate in via Abadia, observattis, cui per ilia plusquam vigenti per vices cum secibus, & cibis immutatis, excitato tumore, in gangrassam, & summam patrilaginem degenerante: Que tamen deposta vermium in genti copia, & ulcere ad cicatricem peraducto, optime convaluit.

Same

Illico

· Illico igitur hoc ferinum , & exitiale witium exftirpandum elt., antequam in. perniciem agantur mileri languentes , & in negotio tam magni momenti studium -ponite, ut ad unguem feratis distinguere accidentia, que a mera fuccorum pravitate procedunt, ab eis, que lumbricorum fævientium motus , aut morfis excitant , in talibus enim similitudines pariunt errores ac difficultates .

XIV.

Stabilito tamen, quod maiori parte,in quibufdam præfertim Regionibus,ac tempestatibus, [ut interim taceam Hungaricam luem, ut Therioden dictam , anne 1540. graffantem, in qua natas passim in corporibus lacertas & viperas, præter ingentem vermium in cerebro copiam narrat Iordanus; aut Sabaudicam febrem paulò post subsequutam ; quam Galli ab effedu diro Trousse galant vocabant, que horsendo vermium vomitu fortiores firangulabat sut fcribit Levinus :] maligne febricitantes malignis pariter feateant vermibus , ea funt ægrotis exhibenda , quæ dum vermes enecare cogitamus, febrem non. augeant. Potio à Zacuto descripta securè usurpari potest .

Rec. Pulpa Tamarind drach. VI.

Sem. Acetofa. C. Bish

Portulace, Plantag. ana drac. f. Syr. de Succo Limon. Acetof , ana unc. i. Aqua Acetofa, Portulaca ana lib. i. Theriaca magne, Confect. Alchermes, Hyacinthine ana drach.ff. Cornu Cerv. Scrup. i. Coralline , Scrup. i.f. Scobis eboree , scrup. ij. Succi Limonum unc. f. Lapidis Bezoart. gr. XX. Corall. rubr. prepar. ferup. f. Mifc.fiat Potio ex intervallis fumenda. Lib. V. prax. Hift. num, 14. obferv. I.

X.V.

Sed efficacius erit auxiliü mercur dulcificatus, qui fecure potul exhiberi à gr. Xad XX. pro etatis, temperamenti, & morbi ratione, in Conferva alique folvente, ut Elect. lenitivo, Caffia, Diapruno, vel in uno autaltero Damasceno folutivo; cujus prestantissima descriptio sic se habet, à Reuer. Pet. Cavallo Sereniss, olim DDi-Mantae meritissimo Archiatro communicata: Rec. Mercury lib. s., puriscetur acere 10, vel succo Rutg depurato, & multiplici per corium trajectione, deinde in Porphyrite and in decatus; donce rer centum solia Auri, que successive ipsi addantus.

DE FEB. MALIG.

in fe attraxerit , & penitus imbiberit. Deinde Rec. Mercury Sublimati puriffimi, abs que Arfenico confecti , lib. ff. adde præcedenti auro imprægnato Mercurio, & fimul In Porphyrite tamdiu ducantur , donec Mercurius delitefcat . Facta hac diligenti mixtura , pulvis inditur cucurbitæ mediocri, cui optime luto ex argilla & arena circa fundum loricatæ, alia fimilis fuperponatur, juacturisque claufis, fornaci imponafur ad ignem apertum, fed moderatum, continuo tamen uno gradu, fex vel 8. horarum circiter, donec fublimatio abfolvatur. Sublimatus ita Mercurins, rejecta farina fatua que in fublimi adherebit, in pulverem redigatur , admifcendo iterum; quod terre inftar in fundo cucurbita pendebit . Aurum prius lotum , & ficcatum fublimetur ut ficque ter aut quater repetafur, ut purior evadat , & purgando mitior.

XVI.

Caterum Apozematibus rarius uti oportebit; frequentius verò pulveribus, & pafillis, ac aliis folidioribus Alexipharmac.

XVII.

Sitis & lingua scabrities mitiganda...
funthumore frigido 3 & ob id tanquam febrisfremedium compescenda este consulte Gal. 6, pop. parte 3. commi 33, voi Hipp. aib. Sirim sedant 3 os claudere, sacere,

127

Sentum cum potu frigide inducere

·XIIX.

Humestabitur porrò lingua fincipite irrigato oleo frigido; aut Rofaceo, aut decotto aliquo frigido herbarum ex alto delabente, Oxyrrhodino, linteo quoque impofito. Et fauces sub mento illinantur hocunguento.

Rec. Olei Violacci ,

Butyri recentis ,

Florum Caffie, and unc. ff. Succi Limonum,

Aque Rosacea, ana unc. i.

Mucilaginis feminum Cydoniorum ; G Fanugraci, in prædicta aqua ex-

tractorum ana drach, ij. Mifce fiat Limentum, quo imbuatur linteum, & applicetur fub mento

XIX.

Retineatur in ore sal Prunellæ: In sebribus enim ardentibus, & malignis Vngaricis, in quibus lingua ad instat prunæ aut carbonis adurebatur, inventium elt secilislime. Retento Cbrystallició ore, & curiosum instrumentum, quod excogitavie. Sanctorius, singulariter prosunt pro huntetánda lingua scabritie y hoc sicar vitro, vel ex argento instar amygdali y refertum foraminulis perexiguis, & pari artisicio, quo Æolipila, iguis scilicer benesicio im-

PAS DE FEBR. MALIG.

pletur vel sero lactis, vel succo Citri, vel vino Granatorum; vel lora quadam acri, su fuavi tamen. Ore dum encumvolvitur, exforaminibus sud sis in modum liquor inselusus paulatim stillans essunditur, se sedat stim, sedaturque tune ob instrumenti motum, quo trahitur ad os aquosa pituita, tum ob succum madefacientem linguam se

XX.

Edat autom laborans frigida cibatia, & olera, utatur Tiagacantho in ovi crudi albumine diffoluto, & cum feminibus Cucumers contrito, ex quo fiat pilula, qua ore detenta paulatim deglutiatur: Abluatur lingua cum modico aceto, aut vino rubro, & aqua hordei. Sonus fupius fitim extinguit, licet in malignis febribus id non fatis respondeat, quinimò supiffimè intensorante efficit.

XXI.

Solet præterea pestilens hujus morbi malignitas sauces invadere, & anginosos assections estimate, tonsillarum tumores; cancrosaulcera, aphonias, gulæ resolutiones, & similia, per quævix deglutire cibos etiam liquidiories possint , & potum per naæs rejiciant; quod in prognosticis est adeò exitiale, uttestatur Historia Anginose, quæ iuxta Aristionem lib.3. Epidect. 2. ægrot. 7. post quam D. Riverius, & alii. Sie sustocario observastis Nobilema

Veronensem Spolverinum, qui decumbebat in foro nundinarum, non potuit evadere, evacuationibus necessariis à principio morbi destitutus. Evast. Cauponis silius, cui sanguis copiose extractus est, & benè purgatus; correprus tamen difficultate deglutiendi cum saucium ulcere, restè convaluit.

XXII.

Remedia pro hoc affectu suerunt predictum linimentum; stequentia Gargarifmata ex decoch Hordei; fol. Oliva; summt. Rubi; in sero lacis caprilli; syrup. Granatorum; sale Prunellæ, aceto Rosaceo, & guttulis spiritus: Vitriolis. Eclegmata ex shere Cattas syrupo aceto somelle. Rosaceo, succo Hordei; sale Prunellæ, & hupi stercore; & tandem cucurbitula submento scarificata; quæalteri non contulerunt; ets. morbum magnoperèminuis sentimo; ante quartum evacuate. Sie quamvis in progresiu morbieveniant symptomata, mitiora erunt; & superabilia.

XXIII.

Aphoniæ igitur, quæ propter antedicias causas anginose eveniunt, nulla indigent propria curatione. nis speciatim suerint convulsorias non quidem universalisprincipii (gravius enim hoc malum est : I sed instrumentorum ad vocem pertinentium

F 5 læ

no DE FEB. MALIG.

Mesione. In his impediri solent quideni voxiper aphonias, i ut servao per anaudias si que il super aphonias si ut servao per anaudias si que il super aphonias quomodocunque in sebrius eventant si prava simt sidicente Hippostate: Sermonis defectio in sebre mala libi. I. Coaci text. 35: sed pepora thulto si cicrebium simul oblèdatur: Que enim si cicrebium simul oblèdatur: Que enim sum semi si emotionem cum silentio modo in mentis emotionem cum silentio etanseunes, lethales sunt, a jebat Hippelibi 2 stest. 21-Coac pranot.

XXIV.

At quam lit gravis aphonia, ex historije Hippocratis intelligetis. Quanquam quos dam viderimus, qui in acutis febtibus ab co cafu convaluerint; ut puella Sartoris filia', que decumbebat in via noua , diebus quindecim integris aphona', cum mentis Emotione , recte convaluit, velicantium prefertim', inter alia remedia pro febris malignitate usurpata, beneficio. Ceterum quam rarum hoc fit si evadere languentes' per similes aphonias, ex his colligite. Philini uxor decimo septinto aphona, vigesimo obiit. Sillenus feptimo & octavo aplionus, undecimo exfpiravit . Phylifcus quinto aphonus, fexto mortuus : Pythioni aphomia' frequens , decimo mors . Phreniticus fecunda die aphonus , quarta obiit : & alia que possent colligi in hujus argumenti tellimonium' . Sed ifta ex Epidemiorum libris fufficiant'.

Reli-

PETR. A. CAST. XXV.

Reliquum eft rut innignem anaudiam r five aphoniam referam, uxoris Barzizija que filiam pepererat : Hec post quindecimam correpta febre , cum' mentis emotione & filentio, mox cum furore & inordinatis motibus convellividebatur, melancholica , anaudes : Addo & catocho modo apirona, & ut cum Hippocrate loquar libe zefect: 2. text. 23. Coacar dicente: Que cum ex solutione catocho modo fiunt aphonia , lethales funt. Non fuit hec lethalis . forfan quia fine virium exfolutiones Quod mirum certe in enixa; copiofillimis lochije estinanita; concreto de atro languine per mentem affatim finente; mechon febre. acuta , cum gravifimis fyinptomatibus agitata ..

XXVI

Modus aphonie's ut catochi , caufam3 arguebat fanguinis in venis concretionems pofferioris p æfertim partis cerebri , quod melancholicis plerumque accidit; humoribus in fubstantiam quandam terream , eraflam , acvifeidam migrantibus , & fpiritu vitali, qui suo motu fuaque tenuitate fanguinem, quem totum peruadit, liquidum reddere folet, præpedito . Respondit eventus": Exhibito namque generoso purgante emetico , ex infusione icil. pulveris Algerotti , urinas minatt elaras quidem; led que citiffine in matulages E 6

131 DE FEB. MALIG.

latinæ instar concreverint, vitto et am insverso adhærentes. Hoc sepe repetito medicamine, & tali succo per urinas-educto, paulò post resspuit, loquela, prudentia, & integra fanitate restitutis.

XXVII.

Fiunt itaq; ex Hippocratis sententia_s
aphonia, & convulsorio modo, & catocho, prout concretus sanguis in alterutruminclinaverit: Siquidem in corpus, epilepica, si autem in mentem, melancholica
fiunt mutitates: lib. 9. Epid. scc. 8. text.
49-convulsionem namque ab humore obstruente, melancholiam verò ab alterante,
& obtenebrante mentis sedem seri cereum es, & invicem commutari non rarum
Melancholici plerumque consueverunt seir epileprici, & epileprici melancholici,
& coccitato.

XXVIII

Mec minus sentiunt oculi hujus sebris malignos insultus. Non refero jam seroces oculos, sixos, immobiles, lumen resugientes. Scintillantes, emortuos, stados, decentos, qui in præsagiendo hujus morbi exitu tantopere præstant, de tam nimis frequenter obsetuantur. ve enimoculi valonista et totum corpus, dicebat Hippoc. Epid. sect. 4: tex. 25. sed distortionem de strabismum, quo solet inuri tanquam stigmatesqui difficulter ab hoc motobora-

ferunt, levi maligni fucci portione in musculos infinuata: fed indicatorio porius, quam convuiforio figno : Ve de co qui decumbebat in horto Dealeis 3. Epid. fect 1. tex. 3. notavit Hippocrates, & nos in. multis observavimus. Quinquagenarius quidam ex Rodulphis, & adolescens Lafrancus, Nobiles Veronenses, post hujus modi gravisimos morbos remaserunt strabones, quorum fenior frequenti ufu pilularum fine quibus, & aggregativ. perfecte convaluit, junior, licet cum oculi aliqua Lesione, optime valet: Nam, quibus autem non [ab ortu] alterius mali solutio. 4b. 2. 6.6.t. 2.

XXIX

Dolor .

Non minus folet in hoc affectu facessere negotium, quam quodvis aliud accidens, eui tanquam majoris mali preludium ocyfame subveniendum eft . Si caput doleat . primo revellendus humor, aut vapor, præmissa universali euacuatione per frictiones, & cucurbitulas ab infernis ad fuperiora: Secundo repellendus à capite hocque levibus, ut Populeo unquento Oxyrrohodino Rofaceo. Item

Syr. de Papav. unc. i. Aq. Bugloffe unc. iii.

Misce . Postea discutiendum, ultimo mitigandum. At totum corque si doluerit ', pra ter universales evacutiones, pullum aliud auxi-

134 DE FEB. MALIG.

lium admittit; prater universales totiuss fictiones. Optimum tamen erit in hisfebribus ardentismis cum ingenti capitisdolore, auxilium frontale apponere, exitellis ouorum sale committis, & conquastis, & inter dio lintea subtilia fronti applicatis, & toti spina dossi

X X X ...

Renum doloribus fuccurrendum; non? externis unctionibus; sed refrigerantibuselyfinis exchordeo; oleo Rôfac-Saccharvitellis ovorum; lacte .. Item alimentistemperatis frigidis; ut ptisana; amylo; feminum frigidorum emultiouibus.

XXXI.

Vigilia sepe in his gravissimum syntptoma, & majorum accidentium minax ocui protinus succurrendum est: Namvires plurimum dissipari, & humores ad caputallicit: Quod quidem solet este dicaputallicit: Quod quidem solet este delirif, acsepe phrenitidis signum & causa: Fit excalore ferventi; & halitibus acribus, & mordacibus; seut exoppressione; dolorecapitis jactatione; inquietudine; que spiritus supra modum attenuant & dispergunt.

XXXII

Necessum eff sientium & quistem imperare, distractis vaporibus, facta diverftone.

f

PETR. A CAST. 43

fione cucurbitulis furis & natibus affixis, ac per ligaturas extremarum partium; Itemrefrigerato fervore aqua frigida, vel apozematum uful, priefertim prope horam fomnis

XXXIII.

Vtendum tamen caute est crurum lavacris, aut saltem præmunito corpore id esticiendum, evcuato nimirum, & ante macularum apparizionem, & in conclavi calido, & humore raptum ad aliquod princepomembrum minante.

XXXIV.

Conciliatur etiam fomnus modulation nibus, fonticulis arte factis, & aquarum currentium leni fusurro . Fatigatione etian. , ut lassatus requiescat: Itaque oportet cogere laborantem apertis oculis stares vel'in lecto federe', ut alii interpretantur, quemadmodum confulit Hippocr. libro 6. Epidem comm. 4 textu 16. Somnus [inquit) stabilis erectorum nectacio . Quamobrem oportet brachia , ac tempore fricare eo tempore, ac illis jubere candelam ardentem manibus tenere , donec defatigati dormire quandoque cupiant s' namivetita appetuntur vehementius . Cavete tamen, ne hac arte uramini in Phrenitide, aut gravi capitis ficcitate inflammatoria, Avicenn. 4. trach 2. c, 20. & 1. 3. tract. 4. 6. 5. & Paulus 1. 2. c. 24.

Som-

Somnus etiam conciliatur medicamentis aut alimentis frigidioribus halituofis, ut amygdalatis & conditis, veluti eo, quod recipit.: Sacebari Violati,

Rofati :

Borraginati, anaunt. ff. Pulv. sem. Papaveris albi,

Faniculi, anadrach.iji
Fiat conditum cum foliis Auri & modleo
Saccharo

Eodem modo in ovo forbili ferup, femis feminis Papaveris nigri adiicere possiumus. Exhibemus etiam eclegmata ex Papavere ad cochlearia tria aut quatu si, in remissione febris prafereim. In diu ore continuantur.

XXXVI

In quem usum miros præstaut: effectus. Syrupus de Laudano, cujus drach, j. usque: ad drac. ij. suarissime &: impune somnum conciliat. Consicitur vero syrupus ex

Syrupo de fucca Citri & Cydoniorum ana unc. IV.

Landaniliquefatti. gutt. LX. Mifceanturian vase vitreo. At Laudanum hoc artificio reddetis liquidum.

Rec, Opy Thebaici in lamina ferrea exica-

Macis ana unc. sem: Spiritus Vitrioli, unc. IV. Aqua Rosarum unt. VI.

F- m2-

PETR. A CAST. 137

F. maceratio per 6. hebdomadas in M. B. Cujus liquoris-per se possume exhiberi gr. ij. ad X. Potes Laudanum Opiatum Quercet. ut accurate jan est praparatum, absque alio labore, quantitate sesquincies macerati in aqua Rosacea, additis tantum Spiritu Vitrioli, & Macere.

XXXVII.

Item potio hæc fomnifera eundem ufum præstat .

Rec. Decoctionis Lactuce , & Portulace.
vehementer expresse , unc. y.

Syr. de Papavere, unc. ..

Mice dentur quatuor faltem horis à cœna.

Si vires sint altoquin imbécilles, adduntur pulveris Diamargaritonis strigida gran10. Præstabit etiam capitis irrigatio exoleo Violaceo, Nempharin, Cucurbite,
Papaveris, cum succis Lactuce, Intybi,
Solani, Vmbilici Veneris.

XXVIII.

Vltimo fomnus conciliatur detentis in eerebro spiritubus animalibus, quo minus possintad sensus instrumenta libere permeare: Quod persicuir unquento Populeo, naribus & fronti illito. Item spomo, aut spongia Hypnotica, de quibus alibi.

XXXIX.

Verum-si neque his vigilia cestaverint,

DE FEB. MALIG.

Saliqua jectigationes, & leues tromores in manibus obferuentur, timor est, ne humor morbosus, aur vapor jam sursum rappiatur : Quoniam caput exsecatum, & cas lefactum præviglia sacile suscipit, a abinterioribus trakit. Bvidentius erit periculum, si forsan aliquantulum dormierit, a turbatus excitetur, aut inter dormiendum loquatur : Providendum erit huit periculoomni arte, ligaturis, frictionibus greenbitulis, elysteribus, vesicantibus reduplicatis, si forsan pam apposita sueriut periotico-

X L.

In hoc casu à quibuscunque somniserie intus exhibitis, presertem ab Opiatis prorfus abstinete, ne dum quietem quæritis , in contrariam affectionem ægrum deducatis: Raptis namque vi foporiferi, ac viroli medicaminis furfum caliginolis vaporibus impense repletur caput', & in profundum foporem , aut immedicabilem typhomaniam facile delabitur. Quapropter in curandis vigiliis, que has febres comitari folent , eftote: vigilantiffimi , ut ad unguem sciatis distinguere occasiones exhibendi fomnifera , vel ab eis abitinendi .. In quenwerrorem fatis infeliciter impegiffe quosdaminon femel observaftis. Notate bene que in præcedentibus Aphoris. exaranturcirca vigilias, velmeras, vel pravis vaporofis fymptomatibus affociatas:

PETR. A CAST. 139

XLI.

Que d'fi jam delirare inceperit, curbitulas furis affigere oportebit; easque fearificare, & plurimum fanguinis extrahere; Si verò neque his conquescat delirium; & adhuc perseueret violentius; derivantibus est agendum; Affigenda erune cucurbitula: cervici & brachiis; & una supra nucham; Eseu primam vertebram I scarificanda; & fi adhuc presentia fis fanguinis; poterint cucurbitula; qua brachiis affigintur; an aparte; supersori nempe, scarificari: Compertum; enim babetur maximi esse momenti in hoce malo hoc remedium.

XLII.

Verum si delirium adhuc non quieverit; conjectandum est aliquid jam este in capite firmatum ; & receptuin; qui nom sufficiunt revussiones; derivationes autrepellentia; sed ad ea; que a capite ipso evacuant deventendum.

XLIII.

Quomobrem antequam in veram phresnitivem malum degeneret; oportebit fretis vena, aut nasi incifa; quod caput receperit, evacuare mox idem per ea auxilia, que infensibilitér evacuant; tenere. Ob id addere Oxyrhodinis aliquid discussor rium op stebit, velur est deum Chamemell, & tantum ejus adjicere necessium érit, quantum symptoma hocalijs auxilijs

140 DE FEB. MALIG.

mon quieverit, donee folum utamur Chamemelino cum modico aceto.

XLIV.

Deinceps verò ad ea , quæ actuali calore resolutionem moliuntur , deveniendum est ; quem usum præstant arieris pulmones adhuc calentes naturalicalore, quosà remissione caloris docoquere poteris
denuò in aqua, adjectis storibus Changameli , ut denuò applicentur , & pluries,
adjectis floribus Chanameli , aut columbarum pulli , aut catuli per dorsum scissione
& pulveribus Santalorum inspersi, & Chamameli, à quibus tamen erit desistendum;
Læger videatur à delirio quiescere...

. XLV

Sed inter truculentiora lymptomata, quorum fatellitio solet sipari tyrannus iste morbus, non est prætermittendus lascivus-furor userims; quem ut seme leum admitatione observastis, sie po test sepus contingero. Mulier illa, que decumbebatad viant novam, maligné sebricitans, circa undecimam diem abortum secit, quantumvis mediocriter lochijs-expurgata; in adeò turgentem coitus appezitum necu potius impudicum uteri surorem incidit, ut pusso pusso pusso pusso morigerata) quas cestro percita, se benè morigerata) quas cestro percita, non solum assistentes quoscunque in secono con continui su con solum assistentes quoscunque in secono con continui morta quas cestro percita, non solum assistentes quoscunque in con continui continui con continui conti

PETR. A CAST.

fectaretur ac folicitaret , fed petulanter apprehenderet, ac in compositis clunium motibus per lectum , quamvis ligata, agitaretur.

XLVI.

Prater naturale temperamentum biliofum , & aduftum fubfufcæ mulieris , putrescentes maligne, & acerrime halitus ad cerebrum delati. & in locis muliebribus pruritum fimul ingentem excitantes, defipientiam iftam pepererunt, quæ per multos dies perseverans , tandein fanguine largiter à pede millo , fotibus , frictionibus, cucurbitulis, ecftrophiis, ac glyceis pellariis (quibus corrupti feminis : non. parua quantitas rejecta, I tandem convenienti exhibito cathartico perfecte curata eft. XLVIL, and what

Solet etiam non minus negotium facelfere importuna fomnolentia & propenfio ad fomnum, que non minus grave malum minatur , quam vigilia : Vt enim hæc phrenitideni, illa lethargum , præfertim fr morbofus apparatus fuerit pituito us a aut cum humorum crudorum , & crastorum copia ; Ifti , dum calefcunt , fur fum halitus denfos, & caliginofos protinus transmittunt, qui non raro lethargum efficunt, Quapropter & his quamprimum fuccurrendum, iisdem ferme auxiliis que pio evitada phrenitide proposuimus, sed frequen-

1842 DE FEB. MALIG.

tiùs & pertinaciùs adhibitis. Omni arte excitandæ sunt facultates animales, avulis pilis, & dissortis digitis pedum aut manuum, ut dormire non permittantur. Oxyrthodina ea sint, qua in resolutione phrenitidis proposumus, nimirum qua oleum. Chamamelinum à principio recipiant. Cucurbitula pariter scarificata supra primas colli vertebras est singulari auxilii.

XLVIII.

Hirudines affigantur venis fedalibus; quod auxilium in prædominio humorum crudorum & crafforum, à quibus ista accidentia dependent, rantum valet, quantum in phrenitide surarum scarificationes ex usu este diximus. Si neque istis somnus excutiatur, sternutamentis utendum eris, & alijs similiter remedijs, que in capite de lethargo, & soporous affectibus à cuntis practicis describuntur.

XLIX,

Præterea solent, qui ista sebre maligna laborant, tentari parogidious, aliquando bono omine, aliquando non. Caput robustum, & validum tentat se exonerare, si vires constiterint, ut per parotides positi educi materia morbisca: Suppuratis & exopurgatis parotidibus, liberantur egrotantes criss quadam impersecta: si verò fractis viribus supervenerint, ægrum pottus jugulant gulant, & co natus nature irritos oftendunt. Quapropter, & motus ifte nature juvandus ett, mo liendum, ut quampmum ad augmentum properent, fed fimul cum aliqua materiae discussione, ne si plus, quam pai sit, materiae peccantis attrahatur, laborans suffocationis periculum, subeat.

L.

Itaque si vires permittant, quamprimum apparentibus parotidibus serit imittendus sanguis ex cephalica, in quantitate mediocri: sin minus, succurpitulas scarificatas brachio ejusdem partis, aut scapulis saffigere oporter; & mox adhibere, que citra maximam attractionem discutiendi vires obtinent: Vt oleum Chamemolinum tepidum, cum Jana sepius adhibitum, axungia galline, aut modicum unquenti Dialthea; quod si ista profuerint, perseverandum est, done ex toto parotides evanescant.

LI.

Sin minùs, emplastro suppurante uti oportet, quod siet ex oleo de semine Lini, Chamæmelino, Crocos vitellis ovorus, ut Galenus 3, pharmacorum secundum locos, cap, de parotidibus utitur, que mitigandi, & leniendi dolores vires obtinent.

LII.

Sicut in aliis, quæ lente prorumpunt petti-

DE FEB. MALIG.

pestilentes sunt, attractoriis uti oportet, & cucurbitis eadem parte affixis.

LIII.

Quod si tantum creverit parotis, aut tam venenosa sit, ut laborans de sussocione periclitetur, antequam natura, aut discussioni, aut suppurationi sussiciat, confultissimum est candenti auro, aut ferro alispo seui illam unico foramine aperires, ut eveneni vis, aut immodica humorum copia facilius exspiret. Quo sanè auxilio plurismos veluti deploratos sanitati suisse restitutos compersum est.

LIV.

Fæda Phebiriasis non rard etiam hune morbum comitatur, malo certo omine, ut dictum est supra, siin principiis appareat, nis purgatione debelletur, remedium, non habet, ut contigit famulo pharmacopola ad D. Zenonem, qui quatta die apparente Phthiriasi, sexta misere extinctus est. Cum enim ad ingentem putredinem, & malignitantem sequatur, vix resistendo sunt miseri languentes: Et quamvis expurgatione timeri merità possita palandromia maligni succi ad interiora, tentari tamen debet in periculoso cisso. Nec minus tentandum purgatione phthiriasim tollere, quam nultos sudores per sonnum sacosa sed hie purgatione sola, illic mintis sementendi purgatione fola, illic mintis sementendi.

PETR. A CAST.

per validifimis alexipharmacis, & frietionibus externis verfus cutem, motum vaporum, qui à fanguine putri elevantur, ex quibus pediculi pullulate folent, cientibus.

LV.

Que in morbi declinatione accidit, ex feterbalis este non solet, incipiente jam natura coccionibus morbium vincere; tedio tamen, & soditate languentes excruciat; necfinit quieten habere: Remedia securita adhiberi possunta, expurgandum eric corpus habita præcipui morbi, & ejus temporis ratione; visceta roboranda, & sanguis putredinali dispositione, insessus quantitudio emundandus.

LV1

Specificum remedium in destruendis radicitus pediculis Mercurius est, tâm intus, tâm extra applicatus; potetă namque fine pracedentis morbi suspicione, lavată cutis aqua istă Mercuriali: paretur decotumeca Scaphide agrin, Fumaria, Scabiola, Lupinis, ain smilibus; vel usurpetur saccus; alterutrius horum simplicium; vel aqua corum stillaticia; cum
quibus in phiala optime agrictur per hora
ad minur spatium Mercurius; separato
postmodum liquere utimini levi spongia
co imbuta, ut cutis seviter madesar: Intus dulci Mercurio mini mitabalius. Si in

non folum roborantur nobiliora vifcera = massa sanguinea, ichorosa, ac putri labe coinquinata expurgatur, fed affectus omnes cutanei , in quos per difficiles iudica-tiones terminari folet ille morbus , propter materiæ peccantis, nunquam fatis bene concocte visciditatem, que extrema cuti adhærefcens Jeam acri exedit prurigine,& freda ac furfuracea contaminat fca-bie , apprime delentur. Quod loco citato fcripht Gal. his verbis : A cute cen fquama abscedit, ac decidit extima cutis Equam Græci vocant enidepuida) ad quam fiftuntur ac retinentur craffi terreig; bumores ad cutem protrufi, à quibus quidem plore, lepre, & elephantes naf-cuntur. Nobili Cantabrolzaguertio, quem olim curavinus; post maliguum morbum illud contigit ut tota epidermis abscedereta cute , non quidem infurfures , aut fquamples, fed in losa oblonga, que à toto dorfo tho tractu evellebantut .- Acris &c. fubtilis, viscida tamen materia hoc effe-cerat sut exuvium seu senestam, serpentis adinfar , convalescendo immutaret ...

EIX.

Sech contingat acrem istam materiam in cutem capitis deponi, de fluvium capitis lorum fequitur, quas per ab sessim, internocapitein cutem, & radites capillorum extrudente sua recrementa: Vnderscheft, ut qui ex soc morbo impensius su delle

DE FEB. MALIG.

delirarunt, superveniente capillorum deshivio liberentur, cò magis, su alia magisapta evacuationes conjungatur: Ve contigit Dexippo, qui post dessuvum capillorum, & urinam simul copiosam, & crassassubsidentiam labentem, a delirio liberatus est, 6: Epid. 1est. 6. text. 27. In sonvalescentibus igitur inplarimum hoc sequitur salubre virium, quod non illicò adstringentibus reprimendum; ne malignilalitus iterum intus se condant; sed cunchandum, donce cerebrum longo dessuvietuert setis exoneratum. Tunc ex Cosmetica quarite remedia, ut suppleat ars, quod
morbur abstulit.

FINIS.





INDEX

C. A. A. S. C. C. A. C.	
Acida in feb. puntticulari experuntu	
Alexipharmaca in feb puncti	
Alexibbaseman	. 98
Alexipharmacorum duplex genus.	. 99
Alvi fluxus in feb. punct.	41
Anaudia sive aphonia insignis exemp	lum
Angina periculosa in feb. punct.	118
ut tractanda.	129
Animi deligaia in feb. puntt.	_
Antidotus Bezoartica Fr. Pone Veron	33
108.	ienji s
Antidotus de Vnicornu dicata Philip Hisp. Regis	Poll.
Athania	113
Aphonia anginos s superveniens quo	modo
I TOUCHDAR .	130
Aqua Cordialis Saxonia Vitriolata.	112
Mercurialis promediculis. 145. Th	eria-
· W.13.	121
Aque frigide porus in feb. pund.	148
- Il millerso parentum en avorum in	2290r-
bis preter consuetudinem mala.	46
Contract of the contract of th	-7-

Basilica Settio abortum facile excitat. 73
G 3 Be-

INDEX

Bernar orient: de occid. Virtus

rumg; dons			102
	,		. "
	C.	" of the c	1
Calor in feb. pun	A. mitis.		- 17
Catatlas maiex.c	ochleis cii (uis teftis	con-
tusis plantis pe	dum affixus	m utile i	n fe-
bribus maligni	c.		82
Ceratum.vesican		lianie.	83
Chirurgice operat	i mec in feh	Dum	65
Cibi fastidium in	fah hund	· Protect .	
		A.L.	24
Ciborum detract	o in lea. has	acces per	
fior			58
Coma in feb. pun			-32
Confectio de bolo.	Armena. 10	9. Hyacii	rthi-
na Hetrusca, H	o6. louberti	. 104. N	apo-
litana.		- "	105
Consusa sempista	muliercula	THE AM	bitio
602 13	~ e , 11.20	2	4.8
Cristallus ore rete	news fitim !	evat	127
Cucurbitule in fe	b. bund.70.	natibus	affi-
xs proficus. 72.			
modus de locus			
Cutis constitutio			
Carra to the transfer of	WELCH FURIN	mmel 140	- 44.
	Dr		- ^
1	23.		

Decotta Chalastica. 77.

Destuvium Capillorum. 148.

Delivium us curandum. 139, si in phrenitide dem decenirare velit. 139.

Denium stridor in feb. punct. 48.

Diasa in feb. punct. 56.

Delor

TNDEX

Dolor in feb.punst. 133 grauis, vel acu	tuso
34. Capitis ut pellendus. 133 - renun	n 4.8
curandus. 134. Ventriculi quomodo	CANA
rigendus. 1392 Syncipitis.	30
- figenaus, 119 Syminters.	
Dyfanterin in feb punctiut trastanda	.125
E	
that the factor of the first the first to	
Effervescentia humorum indicia.	93
Enemata in feb punctor	84
Enema calidius info mortem intulit.	85
Epidermis tota à cute abscedens .	148
Epithemata in feb.punct.	78
Epithema Cordiale.	127
Extraction Citri	115
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
the activities Fig. 15	
Enber lignarius post febrem malignar	n ex'
Cephalea alterum oculum amisit .	122
Facies Hippocration in morbis mala.	
Febris puncticularis nomen. 4. 6 h.	ic 090
pulicaris idem. 4. pulicaris & culi	caris
· he 21 · 10	
quid disserant . Febris puncticularis natura & essenti	4. 1
Definitio., z. at as . 3. caufa.7. Signa.	12.
Sanguinea.14.cum Piruita.15.bilio	So.ih.
melancholica . 15.	min.
Febr. puncticularis ledit facultates	St an
males. 16. Vitales ibinaturales ib.e	31 EX
peftilentium genere.	5
quid differar a vera pestilenti febr	e. 1b.
quid à putridis.	7
In febre punct. nunquam pargandum	CHAR

INDEX

T. Id. P	D W.
Violentis medicamen	tis we was strice 965
Pristiones in feb. pund	
Furfuracea nigra e cal	ites
Furor uterinus at miti	
237.07 11307513110 112 112 112	4
G	
4	
Garzia ab horto dialo	of ofcitanter transe-
lati.	102
H	
Hepatis correboratio.	81
Herba nuper pullulant	es difficulter como-
frantur .	13'
Hirudines in feb pund	
Historia affectus dolos	agrum bonis cum
convales centia sign	is berimentis 54
Harribilatin in febr Du	ind. 38
Hydrargyri in mothis	venenatis-efficacia.
101:	
1	
Inquierndo & iadatio	per lectum in febr.
punct.	30
Inframentum Santte	ry in ore retentum
profiti sedanda.	128
Inunctiones in feb.pun	off
Inunctio Acty .	77
Inlepis Cordialis.87.	ine extradium Gem-
marum M.D.H.	110-
,	
A	L
**	4 .

Lingua ariditar in feb punde

intua

PNDEX

Lingua prognosticon in morbis prej 47. frigida cum evacuaticnibus j matricis malum 47. tremula qui	ympto-
ficat.	
Linimentum prosedanda siti.	1,72
M	
101 -	
Macula in feb. punctic.	28.43
Magisterium Citri.	115
Malleolorum scarificatio .	71
Manus tremule delirium minanta	r . 49
Modicamenta Specifica Alexiphar	maca,
Medicorum vultum & geftus ob	fervant
maxime egrali .	63
Mercurius Specificum medicamen	tum in
purgandis pedicules o 145. dulo	ificatus
. Petri Cawalli.	119
Morbus malignus principio facilis	in pro-
greffu feror. 2	2,13
Morborum motus per pares dies i	pfelicior
eogui fir per impares -	11.38
Morfus ori ventriculi in feb.punc	30
N	

Nausea wentriculi quomodo corrigenda 119

Parosidum in feb. punit. curação. 142 Phaymucia in feb. punit. 86 Phehirrafis in feb. punit. 52. us collenda, 144

IN DEX

Plethora certa indicia.	68
Potio centra vermes Zacuti.6	Dining in
febribus malignis Para. 57.	
136	<i>Journal</i> 90, 11 0
Prognoftica feb. pundt.	80 34
Pulicum puncturas delet far	ina lupino-
rum.	29
Rulsus in feb.punct.quales.	18.43
Pulvis Alexipharmacus Fores	1,114. Man-
suanus.	115
Purgatio in feb. punct. 90. and	e humorum
effervescentiam tentanda.	
	E _p
R	
Trans C	
Remedia primo morbo insultu	neglecta pe-
riculosum .	38
Respiratio in feb. suncti.	: 48
Rigor in feb.punct.	16
*	4
\$	
Sal citri.	115
Sanguis frigidus è vena extra	
rus è vena missus in feb. pu	nct. 47. Pu-
tridus per scarificationem	edučtus. 50
Sanguines stilla in feb punit.	46.50
Saphene sectio in feb.malignis	proficus. 67
Signorum malorum & Sympi	
feb. punct.perseverantia m	
Singultus ut curandus.	120
Sitis in febr.punct.24. & lingu	
ut mitiganda .	411 127
Somnus nimius in feb.pund 52	
grauis oft. 63. ne conciliands	
	Some

INDEX Somnolentie nimia: curatio.

	•
Sputum nigrum periculosum.	50
strabismus ex feb.punstic.	133
Subpurgatio.	95
Sudores in feb. punctic.	26
Suppositoria fapè vicem enematu	
plent.	. 85.
Surdit as in feb punct.	51
Symptomatum in feb.punct.correct	
remissio facultatum actionibus	cessan-
tibus mala.	55
Syrupus ex Laudano. 235. aureus e	
Sylvestribus moschatis paratus	30×148
95. solutivus Regius.	92
T	
Taciturnitas Spontanea in feb. punc	Tie be-
riculosa.	52
Theriaca in affectibus cutaneis u	
usurpatur.	144
Tremores capitis & brachiorum	
stitia.	33
Tristitia insolens in feb. punst.	32
. v	
Vone of History and the fall to be the	
Vena Jectio in principio febris pulicar tim inflituenda.65.quales vene tund	enda.
66.6 fegg.	
Veneno unicuique Juum est alexipha	rm4=
cum.	98
Ventriculi oris morsus in feb: punct,	. 30
Ventriculum corroborandi ratio.	74
	er-
•	

NDEX

Verminatio in feb punct. Vermes per ilin sextricis exeuntes observati. Vermium eiestie in feb. punst. 123 Verona non Permittis venas liberalius secareach. feeus Galliaod Hispania.Ib. Veficantia in feb.punct.79. in quibus adhibenda, & in quibus non. Vigilia in feb punit-9. quome de corrigende.

Vini desiderium in feb.punctic.

Comitus in feare punctic. 24. ut cempe scene 119 dus . Prina in feb.punstic. 19. 47













